



**BAYER**  
**ADVANCED**

# SEASON LONG WEED CONTROL for LAWNS

CONCENTRATE

**Kills Current Weeds**

**Prevents New Weeds**  
up to **6 Months\***

Mata las malezas actuales  
Previene las malezas nuevas hasta por 6 meses



**Won't Harm Lawns†**

†when used as directed; do not use on Carpetgrass, Floratam variety of St. Augustinegrass, Dichondra, or desirable clovers

\*See weed list for 'Kills' & 'Prevents' weeds

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**  
**CAUTION**

See back panel for additional  
precautionary statements

Active Ingredient:  
2,4-D, dimethylamine salt ... 4.73%  
Bisoxafen ... 2.63%  
Mecoprop-p potassium salt ... 1.10%  
Dicamba, potassium salt ... 0.52%  
Other Ingredients ... 91.02%  
Total ... 100.00%



**Rainproof in 1 Hour**

Treats  
**5,000 Sq Ft**  
NET CONTENTS 32 FL OZ (946ml)

79635206 R.1



**BAYER**  
**ADVANCED**

## SEASON LONG WEED CONTROL for LAWNS CONCENTRATE

*The days of multiple applications to kill weeds are over! Just one application of this product's proprietary 2-in-1 formula kills & prevents lawn weeds up to 6 months! It delivers Season Long Weed Control that's simple and easy to use and it will not harm your lawn when used as directed. Rainproof in one hour. Control weeds in your lawn up to 6 months!*

### PRECAUTIONARY STATEMENTS

#### CAUTION Hazards to Humans and Domestic Animals

- Harmful if absorbed through skin or if swallowed.
- Causes moderate eye irritation.
- Avoid contact with skin, eyes, or clothing.
- Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet.
- Remove and wash contaminated clothing before reuse.

#### FIRST AID +

##### IF ON SKIN

- Take off contaminated clothing.
- Rinse skin immediately with plenty of water for 15 – 20 minutes.
- Call a poison control center or doctor for further treatment advice.

##### IF SWALLOWED

- Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice.
- Have person sip a glass of water if able to swallow.
- Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor.
- Do not give anything by mouth to an unconscious person.

##### IF IN EYES

- Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15 to 20 minutes.
- Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.
- Call a poison control center or doctor for further treatment advice.

**NOTE:** Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment.

**You may call toll-free 1-877-229-3763 for medical emergency information.**

Active Ingredients: 4.73% 2,4-D, dimethylamine salt (CAS # 2008-39-1), 0.52% Dicamba, potassium salt (CAS # 10007-85-9), 1.10% Mecoprop-p, potassium salt (CAS # 66423-05-0) and 2.63% Isoxaben (CAS # 82558-50-7).

### ENVIRONMENTAL HAZARDS

- This product is toxic to fish and aquatic invertebrates. Do not apply directly to water.
- Drift or runoff may be hazardous to aquatic organisms in water adjacent to treated areas. Do not contaminate water when disposing of equipment washwaters or rinsate.
- To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid run off to water bodies or drainage systems.

**NOTICE:** Research and testing have determined that the "Directions for Use" are appropriate for the proper use of this product under expected conditions. To the extent consistent with applicable law, the Buyer assumes responsibility for lack of performance or safety if not used according to the directions.

**Money Back Guarantee:** If you are not satisfied with this product, we will gladly refund your original purchase price.

Produced for:  
Bayer Advanced  
A Business Unit of Bayer CropScience LP  
P.O. Box 12014, 2 T.W. Alexander Drive  
Research Triangle Park, NC 27709

Bayer (reg'd), Bayer Cross (reg'd), and  
Bayer Advanced™ are trademarks of Bayer.

EPA Reg. No. 72155-87  
EPA Est. No indicated by 3rd and 4th  
digits of the batch number on this package.  
(65) = 432-TX-1 (39) = 58996-MO-1  
(49) = 072155-AL-001 (13) = 071106-GA-001

PRESS TO RESEAL

7963827Xc12

## IMPORTANTE: Indicaciones para almacenamiento y eliminación

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en el contenedor original y en un lugar fresco y seco fuera del alcance de los niños, preferentemente en un armario bajo llave. Proteger del congelamiento.

### ELIMINACIÓN



**Si está vacío:** Contenedor no reusable. No volver a utilizar ni rellenar este contenedor. Colocar en la basura o entregarlo para reciclar si fuera posible.

**Si está parcialmente lleno:** Llamar a la agencia local de residuos sólidos o al número gratuito 1-877-229-3724 para solicitar indicaciones para la eliminación. Nunca colocar el producto sin utilizar debajo de algún desagüe interno o externo.

## MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

## DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

### PRECAUCIÓN Peligros para seres humanos y animales domésticos

- Es perjudicial si se absorbe por la piel o se ingiere.
- Causa irritación moderada en los ojos.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Lavarse prolijamente con agua y jabón después de manipular este producto y antes de comer, beber, masticar goma de mascar, fumar o ir al baño.
- Quitarse y lavar la ropa contaminada antes de volver a usar.

## PRIMEROS AUXILIOS +

### EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL

- Quitar la ropa contaminada.
- Enjuagar la piel de inmediato con abundante agua durante 15 a 20 minutos.
- Llamar a un médico o a un centro de control de envenenamiento para mayores consultas sobre el tratamiento.

### EN CASO DE INGESTIÓN

- Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento.
- Hacer que la persona beba tragos de agua, si puede tragar.
- No inducir el vómito a menos que lo indique un centro de control de envenenamiento o el médico.
- No administrar nada por boca a una persona inconsciente.

### EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS

- Mantener los ojos abiertos y enjuagar en forma lenta y suave con agua durante 15 a 20 minutos.
- Retirar los lentes de contacto, si los hubiera, después de los primeros 5 minutos, y luego continuar enjuagando los ojos.
- Llamar a un médico o a un centro de control de envenenamiento para mayores consultas sobre el tratamiento.

**NOTA:** Tener el contenedor o la etiqueta del producto a mano al llamar a un médico, un centro de control de envenenamiento o al concurrir a un tratamiento.

**Para solicitar información médica de emergencia, llamar al número gratuito 1-877-229-3763.**

Ingredientes activos: 4.73% 2,4-D, sal dimetilamina [CAS Nº 2008-39-1], 0.52% dicamba, sal de potasio [CAS Nº 10007-85-9], 1.10% mecoprop-p, sal de potasio [CAS Nº 66423-05-0] y 2.63% isoxaben [CAS Nº 82558-50-7].

## PELIGROS AMBIENTALES

- Este producto es tóxico para los peces y los invertebrados acuáticos. No aplicar directamente al agua.
- El rocío y el escurrimiento pueden ser peligrosos para los organismos acuáticos presentes en las aguas adyacentes a las áreas tratadas. No contaminar el agua al eliminar el agua de lavado o enjuague del equipo.
- Para proteger el medio ambiente, no permitir que el pesticida ingrese o se escurra en las bocas de tormenta, zanjas, alcantarillas o aguas superficiales. Aplicar este producto cuando el clima esté calmo y no haya probabilidad de lluvia para las 24 horas siguientes ayudará a garantizar que el viento o la lluvia no dispersen o escurran el pesticida del área de tratamiento. Enjuagar el equipo de aplicación sobre el área tratada ayudará a evitar que ingrese en cursos de agua o sistemas de desagüe.

**NOTA:** Investigaciones y pruebas han determinado que las "Indicaciones de uso" son las adecuadas para el uso apropiado de este producto bajo las condiciones previstas. En la medida que sea acorde con la ley pertinente, el Comprador asume la responsabilidad por la falta de rendimiento o seguridad si no es utilizado de acuerdo con las indicaciones.

**Garantía de devolución de dinero:** Si usted no está satisfecho con este producto, gustosamente le reembolsaremos el monto original del precio de compra.



## READ THE LABEL FIRST!

## QUICK FACTS

- Protects Your Lawn from Weeds up to 6 Months
- Won't Harm Your Lawn†
- Rainproof in 1 Hour



For Use in Hose End or Pump Style Tank Sprayers.



### KILLS & PREVENTS

Kills Dandelion, Clover PLUS 200 other listed weeds.  
Prevents New Weeds from Coming Back up to 6 Months.

### WHEN TO USE

Apply anytime - Spring through Fall.

### WHERE TO USE

ON ESTABLISHED LAWNS without harming lawn grasses  
†(When used as directed; do not use on Carpetgrass, improved varieties of St. Augustinegrass, such as Floratam, Dichondra or desirable clovers.)

### HOW TO USE

To prevent new weeds from growing, spray entire area you want protected. Wait at least 1 hour after applying, then activate preventative weed barrier by watering.  
See Directions for Use for further details.

### COVERAGE

This bottle treats 5,000 sq.ft. (10,000 sq. ft. for Centipede & St. Augustine grasses).



For questions or comments, call toll-free 1-877-BayerAG (1-877-229-3724), or visit our website at [www.BayerAdvanced.com](http://www.BayerAdvanced.com)

### ACTIVE INGREDIENTS:

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| 2,4-D, dimethylamine salt (CAS No. 2008-39-1) ..... | 4.73%          |
| Isoxaben (CAS No. 82558-50-7) .....                 | 2.63%          |
| Mecoprop-p, potassium salt (CAS No. 66423-05-0) ... | 1.10%          |
| Dicamba, potassium salt (CAS No. 10007-85-9) .....  | 0.52%          |
| OTHER INGREDIENTS .....                             | 91.02%         |
| <b>TOTAL</b> .....                                  | <b>100.00%</b> |

### THIS PRODUCT CONTAINS:

0.337 lb 2,4-D acid equivalent (CAS No. 94-75-7) per gal or 3.94%  
0.225 lb Isoxaben (CAS No. 82558-50-7) per gal or 2.63%  
0.080 lb Mecoprop-p acid equivalent (CAS No. 16484-77-8) per gal or 0.94%  
0.038 lb Dicamba acid equivalent (CAS No. 1918-00-9) per gal or 0.44%

Isomer Specific by AOAC Method

EPA Reg. No. 72155-87

EPA Est. No indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package.

(65) = 432-TX-1 (39) = 58996-MO-1

(49) = 072155-AL-001 (13) = 071106-GA-001

79638272c R.2

## FOR OUTDOOR RESIDENTIAL USE ONLY



6 87073 04240 5

OPEN

Resealable Label for Directions & Precautions



## DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

### BEFORE YOU USE

- Use this product only on established lawns.
- Apply when the air is calm to avoid spray drift onto desirable plants.

### HOW MUCH TO USE

- Measure area to be sprayed. Calculate 'square feet' by multiplying length times width.
- For best results, use spray solution immediately. If it is necessary to store, shake vigorously before use. Do not store for more than 3 days.
- **Bermudagrass, Buffalograss, Fescue, Kentucky Bluegrass, Perennial Ryegrass, Zoysiagrass:**  
3.2 fl. oz. (6 1/2 TBS) in 2 gallons of water treats 500 sq. ft.
- **Bahiagrass, Centipedegrass, St. Augustinegrass (not for use on improved varieties of St. Augustinegrass, such as Floratam) or mixtures containing one or more of these grasses:**  
1.6 fl. oz. (3 1/4 TBS) in 2 gallons of water treats 500 sq. ft.
- Food utensils, such as tablespoons and measuring cups, should not be used for food purposes after use with any pesticide.
- The maximum application rate of this product is 6.4 fl. oz. per 1,000 sq. ft. per application per site. The maximum number of broadcast applications per treatment site is 2 per year.

### HOW TO USE Shake Bottle Well Before Use

- To prevent new weeds from growing, you must spray the entire area you want protected, not just the emerged weeds.
- Wait at least 1 hour after applying, then activate preventative weed barrier by watering with 1/4 - 1/2" of irrigation.

#### PUMP STYLE TANK SPRAYERS

Best for spraying individual weeds & small areas.

1. Add the appropriate amounts of water & product to sprayer tank.
2. Close sprayer, shake well and pressurize. Adjust nozzle to a coarse spray.

**Individual weeds** – Hold tip of wand about 12" from weed, aim at center of weed & spray. Also spray the area underneath & around the weed to prevent new weeds from growing.

**Small areas** – apply evenly over area.

3. Occasionally re-pressurize sprayer as needed to maintain a good spray pattern.

#### DIAL-STYLE HOSE-END SPRAYERS

Best for spraying large areas such as the entire lawn.

1. Fill sprayer jar with enough product for the area to be treated. DO NOT ADD WATER.

2. Close sprayer, set dial, hook to garden hose and apply. To avoid contact with the treated area, begin by spraying area farthest from faucet walking backwards as you spray.

3. Pour any unused product back into this original container.

#### CONCENTRATE PLUS WATER HOSE-END SPRAYERS

Best for spraying large areas such as the entire lawn.

1. Pour product into sprayer jar to the required 'Fluid Ounce' level.
2. Add the appropriate amount of water to the 'Gallons' level.
3. Close sprayer, hook to garden hose, shake well & apply. To avoid contact with the treated area, begin by spraying area farthest from faucet walking backwards as you spray.



## DIRECTIONS FOR USE (cont'd)

### WHEN TO APPLY:

- Spray when
  - weeds are small and actively growing
  - temperatures are between 50 - 90°F
- Do not apply while grass is emerging from dormancy.
- Certain hard-to-kill weeds may be retreated in 2 weeks if necessary. Spray individual weeds using this product in a tank sprayer.
- Heavy raking will disturb the weed preventative barrier and reduce the effectiveness of this product.
- Newly seeded lawn may be sprayed after fourth mowing.
- Bare spots may be seeded 60 days after application.

### MOWING:

- Do not mow for 1 to 2 days after spraying.
- Clippings from the first three mowings should be left on the treated area. Do not use clippings from the treated areas as mulch or compost around flowers, ornamentals, trees, or in vegetable gardens.

### WATERING:

- If lawn is dry, water 1 to 2 days before using this product.
- Rain or watering 1 hour after application will not wash away effectiveness.

### HOW IT WORKS

This product contains a proven blend of three weed killers to kill existing weeds PLUS a residual herbicide to keep them from coming back for up to 6 months. Weeds begin to wilt & die within hours and are completely dead in 14 - 28 days. And, it won't harm your lawn when used as directed.

## KILLS (a "1" indicates Kills & Prevents)

|                                 |                                 |                              |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Annual Yellow Sweetclover       | Burning Nettle                  | Dichondra                    |
| Aster                           | Burweed <sup>1</sup>            | Dogbane                      |
| Austrian Fieldcress             | Buttercup                       | Dogfennel                    |
| Bedstraw                        | Buttonweed                      | Dollarweed <sup>1</sup>      |
| Beggarticks                     | Canada Thistle                  | Elderberry                   |
| Betony, Florida                 | Carolina Geranium               | False Dandelion <sup>1</sup> |
| Bindweed, Field                 | Carpetweed                      | False Flax                   |
| Bird Vetch                      | Catchweed Bedstraw              | False Sunflower              |
| Bitter Wintercress              | Catnip                          | Fiddleneck <sup>1</sup>      |
| Bittercress, Hairy <sup>1</sup> | Catsear                         | Florida Pusley               |
| Bitterweed                      | Chickweed, Common <sup>1</sup>  | Frenchweed                   |
| Black-eyed Susan                | Chickweed, Mouseear             | Galinsoga                    |
| Black Medic                     | Chicory                         | Goathead                     |
| Black Mustard                   | Cinquefoil                      | Goldenrod                    |
| Blackseed Plantain              | Clover <sup>1</sup>             | Ground Ivy                   |
| Blessed Thistle                 | Clover, Crimson <sup>1</sup>    | Gumweed                      |
| Bloodflower Milkweed            | Clover, Hop <sup>1</sup>        | Hairy Fleabane <sup>1</sup>  |
| Blue Lettuce                    | Clover, Red <sup>1</sup>        | Hawkweed                     |
| Blue Vervain                    | Clover, Strawberry <sup>1</sup> | Healall                      |
| Bracted Plantain <sup>1</sup>   | Clover, Sweet <sup>1</sup>      | Heartleaf Drymary            |
| Brassbuttons                    | Clover, White <sup>1</sup>      | Heath Aster                  |
| Bristly Oxtongue                | Cockle                          | Hedge Bindweed               |
| Broadleaf Dock                  | Cocklebur                       | Hedge Mustard                |
| Broadleaf Plantain              | Common Mullein                  | Hemp                         |
| Broomweed                       | Creeping Charlie                | Henbit <sup>1</sup>          |
| Buckhorn                        | Creeping Jenny                  | Hoary Cress                  |
| Buckhorn Plantain               | Cudweed <sup>1</sup>            | Hoary Plantain               |
| Bulbous Buttercup               | Curly Dock                      | Hoary Vervain                |
| Bull Thistle                    | Daisy, English                  | Horsenettle                  |
| Bullnettle                      | Daisy, Fleabane                 | Jimsonweed                   |
| Burclover                       | Daisy, Oxeye                    | Knawel                       |
| Burdock                         | Dandelion <sup>1</sup>          | Knotweed                     |

### KILLS (a "1" indicates *Kills & Prevents*) (cont'd)

|                                 |                               |                                  |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Kochia                          | Prostrate Vervain             | Tumble Pigweed                   |
| Lambsquarters <sup>1</sup>      | Puncturevine                  | Velvetleaf <sup>1</sup>          |
| Lespedeza                       | Purslane, Common <sup>1</sup> | Venice Mallow                    |
| Mallow <sup>1</sup>             | Ragweed <sup>1</sup>          | Virginia Buttonweed              |
| Matchweed                       | Red Sorrel                    | Virginia Creeper                 |
| Mexicanweed                     | Redroot Pigweed               | Virginia Pepperweed <sup>1</sup> |
| Milk Vetch                      | Redstem Filaree <sup>1</sup>  | Water Pennywort                  |
| Morningglory                    | Rough Cinquefoil              | Wavyleaf Bullthistle             |
| Mouseear Hawkweed               | Rough Fleabane <sup>1</sup>   | Western Clematis                 |
| Mugwort                         | Russian Pigweed               | Western Salsify                  |
| Musk Thistle                    | Russian Thistle <sup>1</sup>  | White Mustard                    |
| Mustard                         | Scarlet Pimpernel             | Wild Aster                       |
| Narrowleaf Plantain             | Scotch Thistle                | Wild Buckwheat                   |
| Narrowleaf Vetch                | Sheep Sorrel                  | Wild Carrot                      |
| Nettle                          | Shepherdspurse <sup>1</sup>   | Wild Four-o'clock                |
| Orange Hawkweed                 | Slender Plantain              | Wild Garlic                      |
| Oriental Cocklebur              | Smallflower Galinsoga         | Wild Geranium                    |
| Oxalis <sup>1</sup>             | Smooth Dock                   | Wild Lettuce                     |
| Parsley-piert <sup>1</sup>      | Smooth Pigweed                | Wild Marigold                    |
| Parsnip                         | Sorrel                        | Wild Mustard <sup>1</sup>        |
| Pearlwort                       | Sowthistle <sup>1</sup>       | Wild Onion <sup>1</sup>          |
| Pennycress                      | Spanishneedles                | Wild Parsnip                     |
| Pennywort <sup>1</sup>          | Speedwell <sup>1</sup>        | Wild Radish <sup>1</sup>         |
| Pepperweed                      | Spiny Amaranth                | Wild Rape                        |
| Pigweed <sup>1</sup>            | Spiny Cocklebur               | Wild Strawberry                  |
| Pineywoods Bedstraw             | Spiny Sowthistle              | Wild Sweet Potato                |
| Plains Coreopsis (Tickseed)     | Spotted Catsear               | Wild Vetch                       |
| Plantain <sup>1</sup>           | Spotted Spurge <sup>1</sup>   | Woodsorrel <sup>1</sup>          |
| Poison Ivy                      | Spurweed                      | Woolly Croton                    |
| Poison Oak                      | Stinging Nettle               | Woolly Morningglory              |
| Pokeweed                        | Strawberry, India Mock        | Woolly Plantain                  |
| Poorjoe                         | Tall Nettle                   | Wormseed                         |
| Prairie Sunflower               | Tall Vervain                  | Yarrow                           |
| Prickly Lettuce <sup>1</sup>    | Tansy Mustard                 | Yellow Rocket                    |
| Prickly Sida                    | Tanweed                       | Yellowflower Pepperweed          |
| Prostrate Knotweed <sup>1</sup> | Thistle                       | and other                        |
| Prostrate Pigweed               | Trailing Crownvetch           | broadleaf weeds                  |
| Prostrate Spurge                | Tumble Mustard                |                                  |

<sup>1</sup> Kills & Prevents



Do not apply this product in a way that will contact any person or pet, either directly or through drift. Keep people and pets out of the area during application. Do not allow people or pets to enter the treated area until sprays have dried.

### IMPORTANT- Directions for Storage and Disposal

#### STORAGE CONDITIONS

Store in original container in a cool, dry place, out of the reach of children, preferably a locked storage cabinet. Protect from freezing.

#### DISPOSAL



**If Empty:** Non-refillable container. Do not reuse or refill this container. Place in trash or offer for recycling if available.

**If Partly Filled:** Call your local solid waste agency or toll free 1-877-229-3724 for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

### ¡LEER LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO!



Para usar con rociadores con manguera o de tanque estilo bomba



### DATOS RÁPIDOS

- Protege su césped de las malezas hasta por 6 meses
- No daña el césped<sup>†</sup>
- A prueba de lluvia en 1 hora

#### MATA Y PREVIENE

Mata el diente de león, trébol ADEMÁS de otras 200 malezas de la lista. Previene el regreso de nuevas malezas hasta por 6 meses.

#### CUÁNDO USAR

Aplicar en cualquier momento – De primavera a otoño

#### DÓNDE USAR

SOBRE CÉSPEDES ESTABLECIDOS sin dañar la hierba  
<sup>†</sup>(Cuando se utiliza según las indicaciones. No utilizar sobre la grama colorada, ni variedades mejoradas del césped San Agustín, como Floratam, dichondra o tréboles que desee conservar).

#### CÓMO USAR

Para evitar que crezcan nuevas malezas, rociar toda el área que desee proteger. Esperar al menos 1 hora después de la aplicación; luego, regar para activar la barrera preventiva contra las malezas. Consultar las Indicaciones de uso para obtener más detalles.

#### COBERTURA

Esta botella trata 5,000 pies cuadrados (450 metros cuadrados) (10,000 pies cuadrados (900 metros cuadrados) para la hierba Centipede y el césped San Agustín).

### SÓLO PARA USO RESIDENCIAL EN EXTERIORES



Para hacer preguntas o comentarios, llamar al número gratuito 1-877-BayerAG (1-877-229-3724) o visítenos en nuestro sitio Web [www.BayerAdvanced.com](http://www.BayerAdvanced.com)

#### INGREDIENTES ACTIVOS:

2,4-D, sal dimetilamina (CAS Nº 2008-39-1) ..... 4.73%  
Isoxaben (CAS Nº 82558-50-7) ..... 2.63%  
Meccoprop-p, sal de potasio (CAS Nº 66423-05-0) ..... 1.10%

Dicamba, sal de potasio (CAS Nº 10007-85-9) ..... 0.52%  
OTROS INGREDIENTES ..... 91.02%

TOTAL

#### ESTE PRODUCTO CONTIENE:

0.337 libras (153 g) de 2,4-D equivalente ácido (CAS Nº 94-75-7) por galón o 3.94%  
0.225 libras (102 g) de isoxaben (CAS Nº 82558-50-7) por galón o 2.63%  
0.080 libras (36 g) de meccoprop-p equivalente ácido (CAS Nº 16484-77-8) por galón o 0.94%  
0.038 libras (15 g) de dicamba equivalente ácido (CAS Nº 1918-00-9) por galón o 0.44%  
Isómero específico por Métodos AOAC

### INDICACIONES DE USO

Es una violación de la Ley Federal utilizar este producto de manera contraria a la indicada en la etiqueta.

#### ANTES DE USAR

- Aplicar este producto sólo sobre césped establecido.
- Aplicar cuando el viento esté calmado para evitar que el rocío se esparza sobre las plantas que desee conservar.

(continuación)

## INDICACIONES DE USO (continuación)

### CUÁNTO USAR

- Medir el área a rociar. Para calcular los "pies cuadrados" (metros cuadrados), multiplicar el largo por el ancho.
- Para obtener mejores resultados, utilizar la solución de rocío de inmediato. Si es necesario almacenar, agitar vigorosamente antes de usar. No almacenar por más de 3 días.
- **Césped Bermuda, hierba búfalo, cañuela, pasto azul de Kentucky; ballico perenne, césped Zoysia: 3.2 onzas líquidas (100 cc) (6 1/2 cucharadas) en 2 galones (8 litros) de agua tratan 500 pies cuadrados (45 metros cuadrados).**
- **Césped Bahía, hierba Centipede, césped San Agustín (no usar en variedades mejoradas del césped San Agustín como Floratam) o mezclas que contengan uno o más de estos céspedes: 1.6 onzas líquidas (50 cc) (3 1/4 cucharadas) en 2 galones (8 litros) de agua tratan 500 pies cuadrados (45 metros cuadrados).**
- Los utensilios de cocina, como cucharas y tazas medidoras, no deben utilizarse para preparar alimentos luego de ser utilizados con insecticidas.
- La tasa máxima de aplicación de este producto es de 6.4 onzas líquidas (190 cc) cada 1,000 pies cuadrados (90 metros cuadrados) de aplicación por sitio. La cantidad máxima de aplicaciones al voleo por sitio de tratamiento es de 2 por año.

### CÓMO USAR

Agitar bien la botella antes de usar

- Para evitar que crezcan nuevas malezas, debe rociar el área completa que desea proteger, no sólo las malezas que ya surgieron.
- Esperar al menos 1 hora después de aplicar, luego activar una barrera preventiva contra las malezas regando con una irrigación de 1/4 a 1/2" (0.5 a 1.5 cm).

#### ROCIADORES DE TANQUE ESTILO BOMBA

Los más adecuados para rociar malezas individuales y pequeñas áreas.

1. Agregar las cantidades adecuadas de agua y producto en el tanque del rociador.
2. Cerrar el rociador, agitar bien y presurizar. Ajustar la boquilla en modo de rocío grueso. Malezas individuales: sostener la punta de la varilla a aproximadamente 12 pulgadas (30 cm) de la maleza, apuntar al centro de la maleza y rociar. Además, rociar el área debajo y alrededor de la maleza para evitar que crezcan nuevas malezas. Pequeñas áreas: aplicar uniformemente sobre el área.
3. De vez en cuando, volver a presurizar el rociador según sea necesario para mantener un buen patrón de rocío.

#### ROCIADORES DE DISCO CON MANGUERA

Los más adecuados para rociar grandes áreas tales como el césped completo.

1. Llenar el envase del rociador con suficiente producto para el área que se va a tratar. NO AGREGAR AGUA.

2. Cerrar el rociador y fijar el disco, colocar el rociador en la manguera y aplicar. Para evitar el contacto con el área tratada, comenzar a rociar el área más alejada del grifo y caminar hacia atrás a medida que aplica el producto.
3. Verter el producto sin usar nuevamente en este contenedor original.

#### ROCIADORES CON MANGUERA PARA TRATAR CON CONCENTRADO Y AGUA

Los más adecuados para grandes áreas tales como el césped completo.

1. Verter el producto en el envase del rociador hasta el nivel de "Onzas líquidas" necesarias.
2. Agregar la cantidad correspondiente de agua hasta el nivel de "Galones".
3. Cerrar el rociador, conectar a la manguera del jardín, agitar bien antes de aplicar. Para evitar el contacto con el área tratada, comenzar a rociar el área más alejada del grifo y caminar hacia atrás a medida que aplica el producto.

### PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS

#### CUÁNDO APLICAR:

- Rociar cuando
  - las malezas son pequeñas y están en crecimiento activo
  - las temperaturas oscilan entre 50 y 90 °F (10 °C y 32 °C)
- No aplicar mientras el césped retorna del letargo.
- Es posible que determinadas malezas difíciles de eliminar deban volver a tratarse en 2 semanas, si fuera necesario. Rociar las malezas individuales utilizando este producto en un rociador de tanque.
- Rastrear excesivamente alterará la barrera preventiva de malezas y reducirá la eficacia de este producto.
- El césped recién sembrado puede rociarse después de segar por cuarta vez.
- Los puntos descubiertos pueden sembrarse 60 días después de la aplicación.

#### SEGAO:

- No segar por 1 ó 2 días después de rociar.
- Los recortes de césped de los primeros tres segados deben dejarse en el área tratada. No utilizar los recortes de las áreas tratadas como mantillo o abono orgánico alrededor de flores, plantas ornamentales, árboles o en jardines de hortalizas.

#### RIEGO:

- Si el césped está seco, regar 1 ó 2 días antes de utilizar este producto.
  - La lluvia o riego una hora después de la aplicación no afectará la eficacia del producto.

(continuación)

## INDICACIONES DE USO (continuación)

### CÓMO FUNCIONA

Este producto contiene una mezcla probada de tres herbicidas para matar las malezas existentes ADEMÁS de un herbicida residual para evitar que regresen hasta por 6 meses. Las malezas comienzan a marchitarse y mueren en horas y están completamente muertas en 14 a 28 días. Y no daña su césped cuando es utilizado de acuerdo con las indicaciones.

### MATA (un "1" significa Mata y previene)

|                                 |                                      |                                    |                                 |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Trébol amarillo                 | Berbercho                            | Cardo pendiente                    | Cepa caballo                    |
| Aster                           | Bardana menor                        | Mostaza                            | Cerraja brava                   |
| Rorippa austriaca               | Barbasco                             | Plántago de hoja delgada           | Pasto del chanchito             |
| Galium                          | Pilea nummularifolia                 | Veza común                         | Euphorbia maculata <sup>1</sup> |
| Acefitilla                      | Lysimachia nummularia                | Origa                              | Soliva sessilis                 |
| Stachys floridana               | Vira Vira <sup>1</sup>               | Naranja de la vellosilla           | Ortiga mayor                    |
| Manto blanco                    | Romaza                               | Bardana menor                      | Fresa de la India               |
| Vicia cracca                    | Margarita menor                      | Oxalis <sup>1</sup>                | Urtica procerca                 |
| Berro de altura                 | Erigeron philadelphicus              | Alquimilla arvense <sup>1</sup>    | Verbena lila                    |
| Falso berro <sup>1</sup>        | Margarita mayor                      | Chirivía                           | Pamita                          |
| Helenium tenuifolium            | Diente de león <sup>1</sup>          | Sagina procumbens                  | Polygono anfibio                |
| Alma del poeta                  | Dichondra                            | Carrasque                          | Cardo                           |
| Lupulina                        | Verdolaga de la montana              | Obolaria virginica <sup>1</sup>    | Coronilla varia                 |
| Mostaza negra                   | Manzanilla cimarrona                 | Lentejilla                         | Nabo chileno                    |
| Plántago rugelii                | Sombretito de agua <sup>1</sup>      | Bledo <sup>1</sup>                 | Quelile                         |
| Cardo santo                     | Bayo del saúco                       | Pineywoods Bedstraw                | Malva blanca <sup>1</sup>       |
| Hierba de la cucaracha          | Falso diente de león <sup>1</sup>    | Coreopsis tinctoria                | Hibisco                         |
| Lechuga azul                    | Camelina                             | (pilosa de Bidsens)                | Diodia virginiana               |
| Verbena azul                    | Falso girasol                        | Plántago <sup>1</sup>              | Parra virgen                    |
| Plántago aristata <sup>1</sup>  | Amsinckia menziesii var <sup>1</sup> | Hiedra venenosa                    | Lentejilla <sup>1</sup>         |
| Cotula                          | Botoncillo                           | Roble venenoso                     | Centella asiática               |
| Cardo peruno                    | Carrasque                            | Hierba carmin                      | Wavyleaf Bullthistle            |
| Lengua de vaca                  | Galinsoga                            | Diodia teres                       | Clematide                       |
| Plántago mayor                  | Abrojos                              | Girasol silvestre                  | Salsafi                         |
| Gutierrezia dracunculoides      | Vara de oro                          | Lactuca seriola <sup>1</sup>       | Mostaza blanca                  |
| Trigonotis verrucosa            | Hiedra de tierra                     | Afata hembra                       | Aster silvestre                 |
| Llantén menor                   | Pegapega                             | Centinodia <sup>1</sup>            | Enredadera                      |
| Hierba velluda                  | Rana negra <sup>1</sup>              | Bledo rojo                         | (Polygonum convolvulus)         |
| Cardo negro                     | Flor de peña                         | Hierba de golondrina               | Zanahoria silvestre             |
| Mala mujer                      | Cola de ratón                        | Verbena bracteata                  | Maravilla                       |
| Trébol de carretilla            | Cinquillo                            | Abrojos                            | Ajo silvestre                   |
| Bardana                         | Aster ericoides                      | Verdolaga <sup>1</sup>             | Geranio silvestre               |
| Ortiga mayor                    | Campanilla blanca                    | Ambrosia <sup>1</sup>              | Lechuga silvestre               |
| Cadillo <sup>1</sup>            | Erisimo                              | Rumex acetosella                   | Caléndula silvestre             |
| Celidonia menor                 | Cáñamo común                         | Yuyo colorado                      | Mostaza silvestre <sup>1</sup>  |
| Hierba del soldado              | Ortiga mansa <sup>1</sup>            | Alfilerillo <sup>1</sup>           | Cebolla silvestre <sup>1</sup>  |
| Calda vera                      | Antónico                             | Potentilla norvegica               | Chirivía silvestre              |
| Geranio                         | Llantén media                        | Erigeron asperugineus <sup>1</sup> | Rábano silvestre <sup>1</sup>   |
| Verdolaga alfombra              | Verbena stricta                      | Axyris amaranthoides               | Colza silvestre                 |
| Galium aparine                  | Solanum de Carolina                  | Cardo ruso <sup>1</sup>            | Fresa silvestre                 |
| Hierba gatera                   | Beldadina                            | Pimpinella escarlata               | Batata silvestre                |
| Hierba del halcón               | Escleranto                           | Cardo escocés                      | Vicia americana                 |
| Capiqui común <sup>1</sup>      | Sanguinaria                          | Amargosa                           | Oxalis montana <sup>1</sup>     |
| Cerastium vulgatum              | Morenita                             | Bolsa del pastor <sup>1</sup>      | Croton capitatus                |
| Endivia                         | Cenizas <sup>1</sup>                 | Plántago heterophylla              | Palo de rosa                    |
| Tornetilla                      | Lespedeza                            | Galinsoga parviflora               | Hierba del pastor               |
| Trébol <sup>1</sup>             | Malva <sup>1</sup>                   | Rumex altissimus                   | Chenopodium aristatum           |
| Trébol encarnado <sup>1</sup>   | Escobilla                            | Amaranthus hybridus                | Milenrama                       |
| Trifolium agrarium <sup>1</sup> | Caperonia castaneifolia              | Acedera                            | Hierba de Santa Bárbara         |
| Trébol rojo <sup>1</sup>        | Astrágalo                            | Achicoria <sup>1</sup>             | Mastuerzo                       |
| Trébol frías <sup>1</sup>       | Campanilla                           | Bidens bipinnata                   | y otras malezas de hoja ancha   |
| Trébol dulce <sup>1</sup>       | Oreja de ratón                       | Verónica <sup>1</sup>              | <sup>1</sup> Mata y previene    |
| Trébol blanco <sup>1</sup>      | Artemisa                             | Bledo espinoso                     |                                 |



No aplicar este producto de manera que entre en contacto con personas o mascotas, directamente o a través del escurrimiento. Mantener a las personas y a las mascotas alejadas del área durante la aplicación. No permitir a las personas ni a las mascotas ingresar al área tratada hasta que el rocío se haya secado.