



BAYER
ADVANCED



Southern

Weed Killer for Lawns

CONCENTRATE

**KILLS
BROADLEAF
WEEDS**

MATA LAS MALEZAS DE HOJA ANCHA



- For St. Augustine & other Southern lawns
- Won't harm lawns†
- Rainproof in 1 hour

†Do not use on Carpetgrass, Dichondra or Floratam variety of St. Augustinegrass

Active Ingredients:
2,4-D, dimethylamine salt 7.59%
Mecoprop-py dimethylamine salt .. 1.83%
Dicamba, dimethylamine salt 0.84%
Other Ingredients 89.74%
Total 100.00%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION See back panel booklet for additional precautionary statements

Kills 200+ Weeds

Treats up to
16,000 sq ft

NET CONTENTS
32 FL OZ (946mL)

3855935e R4



BAYER
ADVANCED

Southern

Weed Killer for Lawns

CONCENTRATE

This product kills over 200 types of broadleaf weeds in St. Augustine and other Southern lawns. This special formula kills Dollarweed, Spurge, Oxalis and Dandelion without harming your lawn. Controlling weeds in your lawn has never been easier.*

PRECAUTIONARY STATEMENTS

CAUTION Hazards to Humans and Domestic Animals

- Harmful if swallowed.
 - Causes moderate eye irritation.
 - Avoid contact with eyes, skin or clothing.
 - When using this product, wear long-sleeved shirt, long pants, socks, shoes and rubber gloves.
- After using this product:**
- Rinse gloves before removing.
 - Remove clothing and launder separately before reuse.
 - Wash hands thoroughly with soap and water.
 - If product gets on clothing, remove clothing as soon as possible and shower.

FIRST AID +

IF SWALLOWED

- Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice.
- Have person sip a glass of water if able to swallow.
- Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor.
- Do not give anything to an unconscious person.

IF IN EYES

- Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15 to 20 minutes.
- Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.
- Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF ON SKIN OR CLOTHING

- Take off contaminated clothing.
- Rinse skin immediately with plenty of water for 15 to 20 minutes.
- Call a poison control center or doctor for further treatment advice.

IF INHALED

- Move person to fresh air.
- If not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible.
- Call a poison control center or doctor for further treatment advice.

NOTE: When calling poison control center, have this product label accessible. If seeking treatment at an emergency room or doctor's office, bring this product label to show medical personnel.

For medical emergency information, you may call toll-free 1-877-229-3763.

Active Ingredients: 7.59% 2,4-D, dimethylamine salt [CAS # 2008-39-1], 1.83% Mecoprop-p, dimethylamine salt [CAS # 66423-09-4], and 0.84% Dicamba, dimethylamine salt [CAS # 2300-66-5].

ENVIRONMENTAL HAZARDS

- This product is toxic to fish and aquatic invertebrates and may adversely affect non-target plants. Do not apply directly to water, or to areas where surface water is present or to intertidal areas below the mean high water mark, except as noted on appropriate labels.
- Drift and runoff from treated areas may be hazardous to aquatic organisms in water adjacent to treated areas.
- To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid run off to water bodies or drainage systems.
- This chemical has properties and characteristics associated with chemicals detected in groundwater. The use of this chemical in areas where soils are permeable, particularly where the water table is shallow, may result in groundwater contamination. Application around a cistern or well may result in contamination of drinking water or groundwater.
- Most cases of groundwater contamination involving phenoxy herbicides such as 2,4-D and MCPP have been associated with mixing/loading and disposal sites. Caution should be exercised when handling 2,4-D and MCPP pesticides at such sites to prevent contamination of groundwater supplies. Use of closed systems for mixing and transferring this pesticide will reduce the probability of spills. Placement of the mixing/loading equipment on an impervious pad to contain spills will help prevent groundwater contamination.

NOTICE: Research and testing have determined that the "Directions For Use" are appropriate for the proper use of this product under expected conditions. The Buyer assumes responsibility for lack of performance or safety if not used according to the directions.

***Money Back Guarantee:** If you are not satisfied with this product, we will gladly refund your original purchase price.

Produced for: Bayer Advanced
A Business Unit of Bayer CropScience LP
P.O. Box 12014, 2 T.W. Alexander Drive
Research Triangle Park, NC 27709

Bayer (reg'd), Bayer Cross (reg'd), and
Bayer Advanced™ are trademarks
of Bayer.

EPA Reg. No. 72155-4
EPA Est. No indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on
this package. (75) = 5905-AR-1 (71) = 2217-KS-2
(49) = 072155-AL-001 (39) = 58996-MO-1
(13) = 071106-GA-001

PRESS TO RESEAL

3955906 R.4

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN (continuación)

Después de utilizar este producto:

- Enjuagar los guantes antes de quitárselos.
- Quitarse la ropa y lavarla en forma separada antes de volver a usar.
- Lavarse las manos prolijamente con agua y jabón.
- Si el producto entra en contacto con la ropa, quitarse la ropa lo antes posible y ducharse.

PRIMEROS AUXILIOS +

EN CASO DE INGESTIÓN

- Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento.
- Hacer que la persona beba tragos de agua, si puede tragar.
- No inducir el vómito a menos que lo indique el médico o el centro de control de envenenamiento.
- No administrar nada por boca a una persona inconsciente.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS

- Mantener los ojos abiertos y enjuagar en forma lenta y suave con agua durante 15 a 20 minutos.
- Retirar los lentes de contacto, si los hubiera, después de los primeros 5 minutos, y luego continuar enjuagando los ojos.
- Llamar a un médico o a un centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA

- Quitar la ropa contaminada.
- Enjuagar la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 a 20 minutos.
- Llamar a un médico o a un centro de control de envenenamiento para mayores consultas sobre el tratamiento.

EN CASO DE INHALACIÓN

- Trasladar a la persona a un lugar fresco.
- Si hay paro respiratorio, llamar al 911 o a una ambulancia, luego proporcionar respiración artificial, preferentemente de boca a boca, si fuera posible.
- Llamar a un médico o a un centro de control de envenenamiento para mayores consultas sobre el tratamiento.

NOTA: Al llamar a un centro de control de envenenamiento, tener la etiqueta del producto a mano. En caso de solicitar tratamiento en una sala de emergencias o consultorio médico, llevar la etiqueta del producto para mostrarla al personal médico. **Para solicitar información médica de emergencia, llamar al número gratuito 877-229-3763.** Ingredientes activos: 7.59% 2,4-D, sal dimetilamina [CAS N° 2008-39-1], 1.83% mecoprop-p, sal dimetilamina [CAS N° 66423-09-4] y 0.84% dicamba, sal dimetilamina [CAS N° 2300-66-5].

PELIGROS AMBIENTALES

- Este producto es tóxico para los peces y los invertebrados acuáticos y puede afectar negativamente a las plantas a las que no está dirigido. No aplicar directamente al agua o en áreas donde haya aguas superficiales o áreas entre mareas por debajo de la marca de agua media, salvo que se indique lo contrario en las etiquetas correspondientes.
- La deriva y el escurrimiento pueden ser peligrosos para los organismos acuáticos presentes en las aguas adyacentes a las áreas tratadas.
- Para proteger el medio ambiente, no permitir que el pesticida ingrese o se escurra en las bocas de tormenta, zanjas, alcantarillas o aguas superficiales. Aplicar este producto cuando el clima esté calmo y no haya probabilidad de lluvia para las 24 horas siguientes, ayudará a garantizar que el viento o la lluvia no dispersen o escurran el pesticida del área de tratamiento. Enjuagar el equipo de aplicación sobre el área tratada ayudará a evitar que ingrese en cursos de agua o sistemas de desagüe.
- Esta sustancia química contiene propiedades y características relacionadas con sustancias químicas detectadas en aguas subterráneas. El uso de este químico en áreas donde el suelo es permeable, particularmente donde el agua es poco profunda, puede contaminar las aguas subterráneas. La aplicación alrededor de una cisterna o un pozo puede contaminar el agua potable o el agua subterránea.
- La mayoría de los casos de agua subterránea contaminada que involucran herbicidas fenoxi, tales como 2,4-D y MCPP, se han asociado con sitios de mezcla/carga y eliminación. Se debe tener cuidado al manipular pesticidas 2,4-D y MCPP en estos lugares para evitar la contaminación de los suministros de agua subterránea. El uso de sistemas cerrados para la mezcla y el traslado de este pesticida reducirá la probabilidad de que se produzcan derrames. Para ayudar a evitar la contaminación del agua subterránea, se debe colocar el equipo de mezcla/carga sobre una plataforma impermeable para que contenga los derrames.

NOTA: Investigaciones y pruebas han determinado que las "Indicaciones de uso" son las adecuadas para el uso apropiado de este producto bajo las condiciones previstas. El Comprador asume la responsabilidad por la falta de rendimiento o seguridad si no es utilizado de acuerdo con las indicaciones.

***Garantía de devolución de dinero:** Si usted no está satisfecho con este producto, gustosamente le reembolsaremos el monto original del precio de compra.

READ THE LABEL FIRST!

QUICK FACTS

- Kills Over 200 Broadleaf Weeds
- Won't Harm Your Lawn†
- Treats Up To 16,000 Sq. Ft.

KILLS

Over 200 broadleaf weeds such as Dollarweed, Spurge and Oxalis, Dandelion, Clover, Chickweed and other listed weeds

WHERE TO USE

On Lawns

†(When used as directed. Do not use on Carpetgrass, Dichondra or Floratam variety of St. Augustinegrass.)

WHEN TO USE

When weeds are actively growing

HOW MUCH TO USE

Northern Lawns:

Fescue, Kentucky Bluegrass, and Perennial Ryegrasses

and

Hardy Southern Lawns:

Bermuda, Buffalo and Zoysia grasses
2 fl. oz. per 500 sq. ft.

Southern Lawns:

Bahia, Centipede and St. Augustinegrass grasses
1 fl. oz. per 500 sq. ft.



For questions or comments, call toll-free 1-877-BayerAG (1-877-229-3724), or visit us on-line at www.BayerAdvanced.com

ACTIVE INGREDIENTS:

2,4-D, dimethylamine salt 7.59%
Mecoprop-p, dimethylamine salt 1.83%
Dicamba, dimethylamine salt 0.84%

OTHER INGREDIENTS 89.74%

TOTAL

100.00%

THIS PRODUCT CONTAINS:

6.30% 2,4-D acid equivalent
1.51% Mecoprop-p acid equivalent
0.69% Dicamba acid equivalent
Isomer Specific by AOAC Method

EPA Reg. No. 72155-4

EPA Est. No indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package.

(75) = 5905-AR-1 (71) = 2217-KS-2 (49) = 072155-AL-001

(39) = 58996-MO-1 (13) = 071106-GA-001

3955900e R.4

**FOR OUTDOOR
RESIDENTIAL USE ONLY**



6 87073 02890 4

Indicaciones
en español
después de las
de inglés

OPEN
Resealable Label
for Directions &
Precautions



DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. For best results, read and follow all label directions. Do not apply this product in a way that will contact any person or pet, either directly or through drift. Keep people and pets out of the area during application.

BEFORE YOU USE

Read and follow these directions when using:

- Do not apply directly to or near water, storm drains, gutters, sewers, or drainage ditches. Do not apply within 25 feet of rivers, fish ponds, lakes, streams, reservoirs, marshes, estuaries, bays, and oceans. Do not apply when windy. To prevent product run-off, do not over water the treated area(s) to the point of runoff or apply when raining or when rain is expected that day. Rinse applicator over lawn or garden area only.
- Spray when most of the day is expected to remain cooler than 90°F.
- Avoid drift of spray mist onto vegetables, flowers, ornamental plants, shrubs, trees and other desirable plants. Apply when wind is calm.
- The maximum number of broadcast applications per treatment site is two per year.

HOW TO USE Shake Well Before Use

- Determine amount of product to use based on grass type and size of area to be treated.
- Prepare product for use according to How To Apply.
- Apply to lawn.

KILLS

Annual yellow sweetclover	Canada thistle	Galinsoga
Aster	Carolina geranium	Goathead
Austrian fieldcress	Carpeweed	Goldenrod
Bedstraw	Catchweed bedstraw	Ground ivy
Beggarticks	Catnip	Gumweed
Betony, Florida	Catsear	Hairy fleabane
Bindweed, field	Chickweed, common	Hawkweed
Bird vetch	Chickweed, mouseear	Healall
Bitter wintercress	Chicory	Heartleaf drymary
Bittercress, hairy	Cinquefoil	Heath aster
Bitterweed	Clover, crimson	Hedge bindweed
Black-eyed Susan	Clover, hop	Hedge mustard
Black medic	Clover, red	Hemp
Black mustard	Clover, strawberry	Henbit
Blackseed plantain	Clover, sweet	Hoary cress
Blessed thistle	Clover, white	Hoary plantain
Bloodflower milkweed	Cockle	Hoary vervain
Blue lettuce	Cocklebur	Horsenettle
Blue vervain	Common mullein	Jimsonweed
Bracted plantain	Creeping Charlie	Knawel
Brassbuttons	Creeping Jenny	Knotweed
Bristly oxtongue	Cudweed	Kochia
Broadleaf dock	Curly dock	Lambsquarters
Broadleaf plantain	Daisy, English	Lespedeza
Broomweed	Daisy, fleabane	Mallow
Buckhorn	Daisy, oxeye	Matchweed
Buckhorn plantain	Dandelion	Mexicanweed
Bulbous buttercup	Dichondra	Milk vetch
Bull thistle	Dogbane	Morningglory
Bullnettle	Dogfennel	Mouseear hawkweed
Burclover	Dollarweed	Mugwort
Burdock	Elderberry	Musk thistle
Burning nettle	False dandelion	Mustard
Burweed	False flax	Narrowleaf plantain
Buttercup	False sunflower	Narrowleaf vetch
Buttercup	Fiddleneck	Nettle
Buttonweed	Florida pusley	Orange hawkweed
	Frenchweed	Oriental cocklebur
		Oxalis

(con't)

DIRECTIONS FOR USE (cont'd)

KILLS (cont'd)

Parsley-piert	Scotch thistle	Water pennywort
Parsnip	Sheep sorrel	Wavyleaf bulthistle
Pearlwort	Shepherdspurse	Western clematis
Pennycress	Slender plantain	Western salsify
Pennywort	Smallflower galinsoga	White mustard
Pepperweed	Smooth dock	Wild aster
Pigweed	Smooth pigweed	Wild buckwheat
Pineywoods bedstraw	Sorrel	Wild carrot
Plains coreopsis (tickseed)	Sowthistle	Wild four-o'clock
Plantain	Spanishneedles	Wild garlic
Poison ivy	Speedwell	Wild geranium
Poison oak	Spiny amaranth	Wild lettuce
Pokeweed	Spiny cocklebur	Wild marigold
Poorjoe	Spiny sowthistle	Wild mustard
Prairie sunflower	Spotted catsear	Wild onion
Prickly lettuce	Spotted spurge	Wild parsnip
Prickly sida	Spurweed	Wild radish
Prostrate knotweed	Stinging nettle	Wild rape
Prostrate pigweed	Strawberry, India mock	Wild strawberry
Prostrate spurge	Tall nettle	Wild sweet potato
Prostrate vervain	Tall vervain	Wild vetch
Puncturevine	Tansy mustard	Woodsorrel
Purslane, common	Tanweed	Woolly croton
Ragweed	Thistle	Woolly morningglory
Red sorrel	Trailing crownvetch	Woolly plantain
Redroot pigweed	Tumble mustard	Wormseed
Redstem filaree	Tumble pigweed	Yarrow
Rough cinquefoil	Velvetleaf	Yellow rocket
Rough fleabane	Venice mallow	Yellowflower pepperweed
Russian pigweed	Virginia buttonweed	and other broadleaf weeds
Russian thistle	Virginia creeper	
Scarlet pimpernel	Virginia pepperweed	

HOW MUCH TO APPLY

Northern Lawns:

Fescue, Kentucky Bluegrass, and Perennial Rye - 2 fl. oz. (4 Tbs.) per gallon of water

Hardy Southern Lawns:

Bermuda, Buffalo and Zoysia grasses - 2 fl. oz. (4 Tbs.) per gallon of water

Southern Lawns:

Bahia, Centipede, and St. Augustinegrass - 1 fl. oz. (2 Tbs.) per gallon of water

For lawns with mixed grass types, use the lowest rate.

Each gallon of solution treats 500 sq. ft.

TIP: Measure length and width of area to be treated in feet. Multiply these 2 numbers together. This is the area to be treated in square feet (sq. ft.)

HOW TO APPLY

PUMP STYLE SPRAYERS

1. Add the appropriate amounts of water and concentrate to the sprayer tank.
2. Close sprayer, shake well and pressurize.
3. Adjust nozzle to a coarse spray pattern.
4. Large Areas - Apply evenly over area.
Individual Weeds - Hold tip of wand about 12 inches from weed, aim at center of weed and spray.
5. Occasionally re-pressurize the sprayer if needed to maintain a good spray pattern.



(con't)

DIRECTIONS FOR USE (cont'd)

HOW TO APPLY (con't)

DIAL STYLE HOSE-END SPRAYERS

1. Fill sprayer jar with enough concentrate to cover area to be treated.
2. Close sprayer and set dial.
- TIP: The numbers on Dial-Style Hose-End sprayers are ounces of concentrate per gallon of spray.
3. Attach sprayer to hose and apply.
4. To avoid contact with the treated area, begin by spraying area farthest from faucet walking backwards as you spray.



CONCENTRATE-PLUS-WATER HOSE-END SPRAYER

1. Pour concentrate into sprayer jar to the required fluid ounce level.
2. Add the appropriate amount of water to the gallons level.
3. Replace sprayer top and shake well before applying.
4. To avoid contact with the treated area, begin by spraying area farthest from faucet walking backwards as you spray.



HOW IT WORKS

This product is a selective herbicide – it selectively kills weeds in the lawn but won't harm the lawn itself. It is a blend of proven weed killers designed to get broadleaf weeds such as dollarweed, spurge and oxalis.

FOR BEST RESULTS

- Apply when weeds are young and actively growing.
- If the lawn is dry, water 24 hours before using this product.
- Rain or watering one hour after application will not wash away effectiveness.
- Apply 1 to 3 days after mowing.
- Certain hard-to-kill weeds may need to be spot-treated in 14 days.
- Do not apply to new lawns until the grass has reached a height of at least 2 inches.
- Bare spots may be seeded 3 to 4 weeks after application.



Do not allow people (other than applicator) or pets on treatment area during application.

People and pets may re-enter the treated area after it has dried.

IMPORTANT- Directions for Storage and Disposal

STORAGE CONDITIONS

Store in original container in a cool dry place, out of the reach of children, preferably in a locked storage cabinet. Protect from freezing.

DISPOSAL

If Empty:

- Non-refillable container. Do not refill or reuse empty container.
- Place empty container in trash or offer for recycling if available.

If Partly Filled:

- If it is necessary to dispose of unused product please call your local solid waste agency or toll free 1-877-229-3724 for disposal instructions.
- Never place unused product down any indoor or outdoor drain.



¡LEER LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO!

DATOS RÁPIDOS

- Mata más de 200 malezas de hoja ancha
- No daña el césped[†] • Trata hasta 16,000 pies cuadrados (1440 m²)

MATA

Más de 200 malezas de hoja ancha como el sombrerito de agua, letrechezna, oxalis, diente de león, trébol, capiqui y otras malezas de la lista.

DÓNDE USAR

Sobre el césped

[†](Cuando se utiliza según las indicaciones. No utilizar sobre la grama colorada, dichondra o la variedad Floratam del césped San Agustín).

CUÁNDO USAR

Cuando las malezas están en crecimiento activo.

CUÁNTO USAR

Céspedes del norte:

Cañuela, pasto azul de Kentucky y ballicos perennes

y

Céspedes resistentes del sur:

Césped Bermuda, Búfalo y Zoysia

2 onzas líquidas (60 cc) cada 500 pies cuadrados (45 m²)

Céspedes del sur:

Césped Bahía, Centipede y San Agustín

1 onza líquida (30 cc) cada 500 pies cuadrados (45 m²)



Para hacer preguntas o comentarios, llamar al número gratuito 1-877-BayerAG (1-877-229-3724) o visítenos en línea en www.BayerAdvanced.com

Ingredientes Activos:

2,4-D, sal dimetilamina 7.59%

Mecoprop-p, sal dimetilamina 1.83%

Dicamba, sal dimetilamina 0.84%

OTROS INGREDIENTES 89.74%

Total 100.00%

SÓLO PARA USO RESIDENCIAL EN EXTERIORES

ESTE PRODUCTO CONTIENE:

6.30% 2,4-D - equivalente ácido

1.51% Mecoprop-p - equivalente ácido

0.69% Dicamba - equivalente ácido

Isómero específico por Método AOAC

INDICACIONES DE USO

Es una violación de la Ley Federal utilizar este producto de manera contraria a la indicada en la etiqueta. Para obtener mejores resultados, leer y seguir todas las indicaciones de la etiqueta. No aplicar este producto de manera que entre en contacto con personas o mascotas, directamente o a través del escurrimiento. Mantener a las personas y a las mascotas alejadas del área durante la aplicación.

ANTES DE USAR Leer y seguir estas indicaciones de uso

- No aplicar directamente o cerca del agua, bocas de tormenta, canales de desagüe, alcantarillas o zanjas. No aplicar dentro de los 25 pies de distancia de ríos, estanques, lagos, arroyos, represas, pantanos, estuarios, bahías y océanos. No aplicar cuando hay viento. Para evitar que el producto se escurra, no regar en exceso el área o áreas tratadas hasta el punto de escurrimiento ni aplicar cuando llueve o cuando se esperan lluvias para ese día. Enjuagar el aplicador solamente sobre el área del césped o jardín.
- Rociar cuando se espera que la mayor parte del día tenga una temperatura inferior a 90 ° F (32 ° C).
- Evitar que la niebla del rocío se escurra sobre hortalizas, flores, plantas ornamentales, arbustos, árboles y otras plantas que desee conservar. Aplicar cuando el viento esté calmo.
- La cantidad máxima de aplicaciones al voleo por sitio de tratamiento es de dos por año.

CÓMO USAR Agitar bien antes de usar

- Determinar la cantidad de producto a usar en base al tipo de césped y al tamaño del área a tratar.
- Preparar el producto para utilizar de acuerdo con las indicaciones de "Cómo aplicar".
- Aplicar al césped.

MATA

Trébol amarillo	Barbano menor	Mostaza	Cerraja brava
Aster	Barbasco	Plántago de hoja delgada	Pasto del chanco
Rorippa austriaca	Pilea nummularifolia	Veza común	Euphorbia maculata
Galium	Lysimachia nummularia	Ortiga	Soliva sessilis
Acetilla	Vira Vira	Naranja de la vellosilla	Ortiga mayor
Stachys floridana	Romaza	Barbano menor	Fresa de la India
Manto blanco	Margarita menor	Oxalis	Urtica procera
Vicia cracca	Erigeron philadelphicus	Alquimila arvense	Verbena lila
Berro de altura	Margarita mayor	Chirivía	Pamita
Falso berro	Diente de león	Sagina procumbens	Polígono anfibio
Helenium tenuifolium	Dichondra	Carrasque	Cardo
Alma del poeta	Verdolaga de la montaña	Obolaria virginica	Coronilla varia
Lupulina	Manzanilla cimarrona	Lentejilla	Nabo chileno
Mostaza negra	Sombrerito de agua	Bledo	Queleite
Plántago rugelii	Bayo del saúco	Pineywoods bedstraw	Malva blanca
Cardo santo	Falso diente de león	Coreopsis tinctoria	Hibisco
Hierba de la cucaracha	Camelina	(pilosa de Bidsens)	Diodia virginiana
Lechuga azul	Falso girasol	Plántago	Parra virgen
Verbeña azul	Amsinckia menziesii var	Hiedra venenosa	Lentejilla
Plántago aristata	Botoncillo	Roble venenoso	Centella asiática
Cotula	Carrasque	Hierba carmin	Wavyleaf bullthistle
Cardo perruno	Galinsoga	Diosa teres	Clemátide
Lengua de vaca	Abrojos	Girasol silvestre	Salsifí
Plántago mayor	Vara de oro	Lactuca seriola	Mostaza blanca
Gutierrezia dracunculoides	Hiedra de tierra	Alfalfa hembra	Aster silvestre
Trigonotis verrucosa	Pegapaga	Centinodia	Enredadera
Llantén menor	Rama negra	Hierba de golondrina	Bledo rojo
Hierba velluda	Cola de ratón	Verbeña bracteata	Zanahoria silvestre
Cardo negro	Cinquillo	Abrojos	Maravilla
Malva mujer	Aster ericoides	Verdolaga	Ajo silvestre
Trébol de carretilla	Campanilla blanca	Ambrosia	Gergano silvestre
Barbano	Erisimo	Rumex acetosella	Lechuga silvestre
Ortiga mayor	Malva	Yuyo colorado	Caléndula silvestre
Cadillo	Ortiga mansa	Alfilerillo	Mostaza silvestre
Celidonia menor	Antóhico	Potentilla noruega	Cebolla silvestre
Hierba del soldado	Llantén media	Erigeron asperugineus	Chirivía silvestre
Calida vera	Verbeña stricta	Axyris amaranthoides	Rábano silvestre
Geranio	Solanum de Carolina	Cardo ruso	Colza silvestre
Verdolaga alfombra	Belladona	Pimpinela escarlata	Fresa silvestre
Galium aparine	Hierba gatera	Cardo escocés	Batata silvestre
Hierba del halcón	Sanguinaria	Amargosa	Vicia americana
Capiquí común	Moreña	Bolsa del pastor	Oxalis montana
Cerastium vulgatum	Cenizas	Plántago heterophylla	Croton capitatus
Endivia	Lespedeza	Galinsoga parviflora	Palo de rosa
Tormetilla	Escobilla	Rumex altissimus	Hierba del pastor
Trébol encarnado	Caperonia castaneifolia	Amaranthus hybridus	Chenopodium aristatum
Trébol rojo	Astrágalo	Acedera	Milenrama
Trébol fresa	Campanilla	Chicoria	Hierba de Santa Bárbara
Trébol dulce	Oreja de ratón	Bidens bipinnata	Mastuerzo
Trébol blanco	Artemisa	Bledo espinoso	y otras malezas de hoja ancha
Berbecho	Cardo pendiente	Cepa caballo	

CUÁNTO APLICAR

Céspedes del norte: Cañuela, pasto azul de Kentucky y ballico perenne: 2 onzas líquidas (60 cc) (4 cucharadas) por cada galón de agua (4 litros)

Céspedes resistentes del sur: Césped Bermuda, Búfalo y Zoysia: 2 onzas líquidas (60 cc) (4 cucharadas) por cada galón de agua (4 litros)

Céspedes del sur: Césped Bahía, Centipede y San Agustín: 1 onza líquida (30 cc) (2 cucharadas) por cada galón de agua (4 litros).

Para los céspedes con tipos de hierba combinados, utilizar la tasa más baja.

Cada galón (4 litros) de solución trata hasta 500 pies cuadrados (45 m²)

CONSEJO: Medir la longitud y ancho del área a tratar en pies (metros). Multiplicar estos dos números. El resultado es el área a tratar en pies cuadrados (m²).

CÓMO APLICAR

ROCIADORES DE TANQUE ESTILO BOMBA

1. Agregar las cantidades adecuadas de agua y concentrado en el tanque del rociador.
2. Cerrar el rociador, agitar bien y presurizar.

(continuación)

CÓMO APLICAR (continuación)

ROCIADORES DE TANQUE ESTILO BOMBA (continuación)

3. Ajustar la boquilla en modo de rocío grueso.
4. Grandes áreas: aplicar uniformemente sobre el área.
- Malezas individuales: sostener la punta de la varilla a aproximadamente 12 pulgadas (30 cm) de la maleza, apuntar al centro de la maleza y rociar.
5. De vez en cuando, volver a presurizar el rociador según sea necesario para mantener un buen patrón de rociado.



CÓMO APLICAR

ROCIADORES DE DISCO CON MANGUERA

1. Llenar el envase del rociador con concentrado suficiente para cubrir el área a tratar.
2. Cerrar el rociador y fijar el disco. DATO: los números en los rociadores de disco con manguera corresponden a las onzas de concentrado por galón de rocío.
3. Colocar el rociador en la manguera y aplicar.
4. Para evitar el contacto con el área tratada, comenzar a rociar el área más alejada del grifo y caminar hacia atrás a medida que aplica el producto.



CÓMO APLICAR

ROCIADOR CON MANGUERA PARA TRATAR CON CONCENTRADO Y AGUA

1. Verter el concentrado en el envase del rociador hasta el nivel de onzas líquidas necesarias.
2. Agregar la cantidad correspondiente de agua hasta el nivel de galones.
3. Volver a colocar la tapa del rociador y agitar bien antes de aplicar.
4. Para evitar el contacto con el área tratada, comenzar a rociar el área más alejada del grifo y caminar hacia atrás a medida que aplica el producto.



CÓMO FUNCIONA

Este producto es un herbicida selectivo – elimina las malezas del césped en *forma selectiva* sin dañar el césped. Es una mezcla de herbicidas probados diseñados para atacar las malezas de hoja ancha como el sombrerito de agua, la lechetezra y el oxalis.

PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS

- Aplicar cuando las malezas son jóvenes y están en crecimiento activo.
- Si el césped está seco, regar 24 horas antes de usar este producto.
- El agua de lluvia o riego uno hora después de la aplicación no afectará la efectividad del producto.
- Aplicar de 1 a 3 días después de segar.
- Es posible que determinadas malezas difíciles de eliminar deben volver a tratarse en 14 días de forma localizada.
- No aplicar sobre el césped nuevo hasta que haya alcanzado una altura mínima de 2 pulgadas (5 cm).
- Los puntos descubiertos pueden sembrarse de 3 a 4 semanas después de la aplicación.



No permitir a las personas (excepto al aplicador) ni a las mascotas ingresar al área tratada durante la aplicación.

Las personas y las mascotas pueden volver a ingresar al área tratada después de que el producto se haya secado.

IMPORTANTE – Indicaciones para almacenamiento y eliminación.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en el contenedor original y en un lugar fresco y seco fuera del alcance de los niños, preferentemente en un armario bajo llave. Proteger del congelamiento

ELIMINACIÓN



- Si está vacío:**
- Contenedor no reusable. No volver a rellenar ni utilizar este contenedor.
 - Colocar el contenedor en la basura o entregarlo para reciclar si fuera posible.
- Si está parcialmente lleno:**
- Si es necesario eliminar el producto sin utilizar, llamar a la agencia local de residuos sólidos o al número gratuito 1-877-229-3724 para solicitar indicaciones para la eliminación.
 - Nunca colocar el producto sin utilizar debajo de algún desagüe interno o externo.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN Peligros para seres humanos y animales domésticos

- Es perjudicial si se ingiere.
- Causa irritación moderada en los ojos.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Al utilizar este producto, usar camisa de mangas largas, pantalones largos, medias, zapatos y guantes de goma.

(continuación)