

BIOADVANCED
SCIENCE-BASED SOLUTIONS

12 Month

Tree & Shrub Protect & Feed

CONCENTRATE II

This product provides fast acting and 12-month long lasting systemic protection against damaging listed insects including Adelgids, Aphids, Borers (including Emerald ash borer), Caterpillars, Japanese beetles (adult), Leafminers, Scale, and Whiteflies plus feeds in a single application. Having beautiful trees and shrubs has never been easier.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

CAUTION Hazards to Humans and Domestic Animals

- Harmful if absorbed through skin. Harmful if swallowed.
- Avoid contact with skin, eyes, or clothing.
- Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, or using tobacco.
- Remove and wash contaminated clothing before reuse.

FIRST AID +

Neonicotinyl Insecticide

IF SWALLOWED

- Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice.
- Have person sip a glass of water if able to swallow.
- Do not induce vomiting unless told to do so by the poison control center or doctor.
- Do not give anything by mouth to an unconscious person.

IF INHALED

- Move person to fresh air.
- If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration.
- Call a poison control center or doctor for further treatment advice.

IF ON SKIN OR CLOTHING

- Take off contaminated clothing.
- Rinse skin immediately with plenty of water for 15 to 20 minutes.
- Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF IN EYES

- Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15 to 20 minutes.
- Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.
- Call a poison control center or doctor for treatment advice.

NOTE: Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment.

You may contact 877-229-3763 for emergency medical treatment information.

Active Ingredients: 0.74% Imidacloprid (CAS # 138261-41-3) and 0.37% Clothianidin (CAS # 210880-92-5)

ENVIRONMENTAL HAZARDS

- This pesticide is toxic to aquatic invertebrates. Drift and runoff may be hazardous to aquatic organisms in neighboring areas. Do not apply where runoff is likely to occur.
- To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid run off to water bodies or drainage systems.
- This product is highly toxic to bees exposed to direct treatment or residues on blooming crops or weeds. Do not apply this product or allow to drift to blooming crops or weeds if bees are visiting the treatment area.

NOTICE: Research and testing have determined that the "Directions for Use" are appropriate for the proper use of this product under expected conditions. The Buyer, to the extent consistent with applicable law, assumes responsibility for lack of performance or safety if not used according to the directions.

Money Back Guarantee: 100% satisfaction guaranteed or your money back.

Distributed by:
SBM Life Science Corp.
PO Box 525,
Morrisville, NC 27560

BioAdvanced® is a registered trademark of
SBM Life Science Corp.

EPA Reg. No. 92564-39

EPA Est. No indicated by 3rd and 4th digits of the batch
number on this package.

(65) = 92564-TX-1 (57) = 071106-GA-003

(46) = 88746-MO-1

PRESSTO RESEAL

50120243 190621VI

NO SPRAYING!**JUST MIX...****AND POUR.****PROTECTS & FEEDS
ENTIRE TREE OR SHRUB****FOR OUTDOOR
RESIDENTIAL USE ONLY****ACTIVE INGREDIENTS:**

Imidacloprid 0.74%

Clothianidin 0.37%

OTHER INGREDIENTS 98.89%

Total 100.00%

GUARANTEED ANALYSIS

Total Nitrogen (N) 2.0%

0.4% Ammoniacal Nitrogen

0.6% Urea Nitrogen

1.0% Other Water Soluble Nitrogen*

Available Phosphate (P_2O_5) 1.0%Soluble Potash (K_2O) 1.0%

Derived from Urea-Triazone,

Methylene urea, Ammonium

phosphate, Muriate of Potash

*1.0% Slowly Available Nitrogen from Urea-Triazone Solution and Methylene urea

This product does not contain live microbial inoculum.

Fertilizer components are all synthetically derived.

Information regarding the contents and levels of metals

in this product is available on the internet at

<http://www.aapfco.org/metals.html>

Net Weight 2.24 lbs. (1.01 kg.)

READ THE LABEL FIRST!**QUICK FACTS**Indicaciones
en español
después de las
de inglés

- Provides 12-Month Long Insect Protection
- Provides Slow Release Feeding
- No Spraying! Just Mix and Pour
- Rainproof Protection

KILLS

Adelgids, Aphids, Borers (including Emerald Ash Borer), Caterpillars, Japanese Beetles, Leafminers, Scale, Whiteflies and other listed pests

WHERE TO USE

Outdoor ornamental trees and shrubs and containerized plants. This product is only for non-bearing fruit and nut trees. Non-bearing fruits and nuts are plants that do not bear edible fruits and nuts for at least 12 months after application of pesticides. Not for use on lawns.

HOW TO USE

1. Measure distance around tree trunk or height of shrub or determine container size
2. Measure and pour required amount of product into bucket of water
3. Pour solution around tree or shrub base or in container

HOW MUCH TO USE**Trees:** 1 oz for every inch of distance around trunk; treats 4 trees that measure 8 inches around trunk**Shrubs:** 3 oz for every foot of height; treats 5 shrubs that are 2 foot tall**Containerized Plants:**1 $\frac{2}{3}$ Tablespoons for each five gallon container; treats up to 42 - five gallon containersFor questions or comments, call toll-free 1-877-229-3724 or visit our website at www.BioAdvanced.com**F 3372**

EPA Reg. No. 92564-39

EPA Est. No indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package. (65) = 92564-TX-1

(57) = 071106-GA-003

(46) = 88746-MO-1



501420343 190621V1

OPEN
Resealable Label
for Directions &
Precautions

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal Law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

Before use, read and follow all label directions.

BEFORE YOU USE Read and follow directions when using.

Restrictions:

- Do not apply near lakes, streams, rivers, or ponds.
- Do not apply to soils which are waterlogged or saturated.
- Bucket or measuring utensils should not be used for any food or drinking water purposes after use with this product.
- Do not apply when bees are actively foraging in the area.
- Children and pets may re-enter the treated area after it has dried.
- Do not apply this product, by any application method, to linden, basswood, or other Tilia species.
- Do not use on lawns.



HOW TO USE

Determine the amount to use by measuring the distance around the tree trunk or height of the shrub.

Pour the required amount of this product into a bucket of water and empty the bucket around the base of the tree/shrub.

For containerized plants, determine container size and pour required amount of this product into enough water to wet the potting soil thoroughly but not causing loss of water from bottom of container.

FOR USE ON

Outdoor ornamental trees, shrubs and containerized plants not intended to be used as edible food. This product is only for non-bearing fruit and nut trees. Non-bearing fruits and nuts are plants that do not bear edible fruits and nuts for at least 12 months after application of pesticides.

CONTROLS

Adelgids	Leafhoppers (including Glassy-winged Sharpshooter)
Aphids	Leafminers (including Birch and Boxwood Leafminers)
Armored Scales (suppression)	Mealybugs
Borers	Pine Tip Moth Larvae
Roundheaded (including Eucalyptus Longhorned Borers and Asian Longhorned Beetle)	Psyllids
Flatheaded (including Bronze Birch, Alder, and Emerald Ash Borers)	Royal Palm Bugs
Pine Bark Beetles (including Ips beetles) (suppression)	Root Weevil Larvae (including black vine weevils)
Caterpillars (including gypsy moths, fall webworms, and tent caterpillars)	Sawfly Larvae
Fungus Gnat Larvae	Soft Scales (including lobate lac scales)
Japanese Beetles, Adult	Thrips
Lace bugs	Whiteflies
Leaf Beetles (including Elm Leaf, Viburnum Leaf, and Lily Leaf Beetles)	White Grub larvae (such as Japanese Beetles, Chafer, European Chafer, Oriental Beetle, Asiatic Garden Beetle)

(cont'd)

DIRECTIONS FOR USE (cont'd)

HOW MUCH TO APPLY

TREES

Measure the distance in inches around the tree trunk at approximately 4.5 feet from ground level. This measurement is the amount of ounces of product to add to 1 gallon of water.

Example: A tree measuring 8 inches around, pour 8 ounces of product into 1 gallon of water. If the tree measures greater than 50 inches around, pour the required product into 2 gallons of water. A flexible tape measure is the recommended method for measuring the distance around a tree.

TREES WITH 2 OR MORE TRUNKS

Measure the distance in inches around each tree trunk at approximately 4.5 feet from ground level, add together, and multiply by 0.75. This measurement is the number of ounces of product to add to one gallon of water.

Example: A tree has 4 trunks. They measure 20, 10, 5, and 5 (inches) or a total of 40 inches. $40 \times 0.75 = 30$ ounces, pour 30 ounces of product into one gallon of water. If 50 or more ounces of product are required, pour into 2 gallons of water.

SHRUBS

Measure the height of the shrub to the nearest foot. Multiply the number of feet by 3 – this is the number of ounces of product to add to 1 gallon of water.

CONTAINERIZED PLANTS

Container Size	Amount Product Needed
1 gallon	1 teaspoon
2 gallon	2 teaspoons
3 gallon	1 Tablespoon
5 gallon	1 2/3 Tablespoons
10 gallon	3 1/3 Tablespoons
15 gallon	5 Tablespoons
20 gallon	6 2/3 Tablespoons

Pour the required product into sufficient water to wet the potting soil thoroughly. To help assure that roots absorb the insecticide, do not water too heavily for the first 10 days.

Note: 3 teaspoons = 1 Tablespoon 2 Tablespoons = 1 fl. oz.

Restrictions: Do not make more than one application per year. Regardless of formulation or type of application, DO NOT apply more than a total of 0.4 lbs clothianidin per acre.

HOW TO APPLY

Trees and Shrubs:

- Fill a bucket or watering can with 1 gallon of water. For trees with circumference greater than 50", use 2 gallons of water.
- Shake the bottle well.
- Carefully measure required amount of product into bucket.
- Slowly pour the solution evenly around the tree. For best results, pour as close to the TRUNK/main stem of the tree/shrub as possible.
- Fill the bucket with clean water and pour it around the trunk as well.

Containerized Plants:

- Apply the solution evenly on top of potting soil and water thoroughly.
- For the first 10 days, avoid flushing through the container to the point where it flows out the bottom.
- For indoor containerized plants, bring outdoors, make treatment, and return indoors when no excess water is present.

(cont'd)

DIRECTIONS FOR USE (cont'd)


HOW TO APPLY (cont'd)

Additional Directions:

- Pull back mulch and weed barrier before application.
- Use this product as part of an overall tree and shrub health care program before problems start. This product can be applied anytime except when the soil is waterlogged or frozen. These conditions inhibit the movement of the product down into the root zone. During prolonged dry periods, saturate the soil around the tree or shrub well with water the night before making an application.
- For severe infestations, treat with a foliar insecticide such as BioAdvanced® 3-n-1 Insect, Disease & Mite Control Concentrate then use this product as part of a routine care program.

HOW IT WORKS

The insecticide and fertilizer dissolved in water moves down through the soil, where it is absorbed by the roots. Once absorbed, it moves up through the tree or shrub providing year-long insect protection and feeds. This product even moves into new growth after application, thus protecting and feeding it, too! To get complete results, the insecticide and fertilizer must distribute completely through the tree or shrub. Depending on the size and health of the plant, this may take one week to three months (for very large trees). Rain or water cannot wash off this internal protection and feeding.



NOTE: Application to trees heavily infested may not prevent their eventual loss due to existing pest damage and tree stress.

DIRECTIONS FOR STORAGE AND DISPOSAL

PESTICIDE STORAGE CONDITIONS

Store in original container in a cool, dry place, out of the reach of children, preferably a locked storage cabinet.
Protect from freezing.

PESTICIDE DISPOSAL



If Empty:

- Non-refillable container. Do not refill or reuse container.
- Rinse the empty product container thoroughly and disperse the rinse water around trees or shrubs as part of application.
- Place empty container in trash or offer for recycling if available.

If Partly Filled:

- Call your local solid waste agency or toll free 1-877-229-3724 for disposal instructions.
- Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

¡SIN ROCIAR!



SÓLO MEZCLAR...



Y VERTER.



PROTEGE Y FERTILIZA LA TOTALIDAD DEL ÁRBOL O ARBUSTO

SÓLO PARA USO RESIDENCIAL EN EXTERIORES

INGREDIENTES ACTIVOS:

Imidacloprida 0,74%

Clotianidina 0,37%

OTROS INGREDIENTES ... 98,89%

Total 100,00%

ANÁLISIS GARANTIZADO

Nitrógeno total (N) 2,0%

0,4% nitrógeno en amoníaco

1,0% nitrógeno en urea

1,0% otro nitrógeno soluble en agua*

Fosfato disponible (P_2O_5) 1,0%

Potasa soluble (K_2O) 1,0%

Derivado de urea-triazona, urea metileno, fosfato de amoníaco, muriato de potasa

*1,0% de nitrógeno de disponibilidad lenta de solución de urea-triazona y urea metileno

Este producto no contiene inóculo de microorganismos vivos. Los componentes del fertilizante están todos sintéticamente derivados.

La información sobre los contenidos y niveles de metales en este producto está disponible en Internet en <http://www.aapfco.org/metals.html>

¡LEER LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO!

DATOS RÁPIDOS

- Proporciona 12 meses de protección contra los insectos
- Suministra fertilizante de liberación lenta
- ¡Sin rociar! Sólo mezclar y verter
- Protección a prueba de lluvia

MATA	Adélgidos, áfidos, barrenadores (incluso barrenador esmeralda del fresno), orugas, escarabajos japoneses, minadores de las hojas, escamas, moscas blancas y otras plagas de la lista.
DÓNDE USAR	Árboles ornamentales de exterior, arbustos, y plantas en macetas. Árboles y arbustos de exteriores y plantas de almacigo. Este producto está destinado sólo a árboles sin frutos y sin frutos secos. Las plantas sin frutos y sin frutos secos son plantas que no poseen frutos comestibles y frutos secos durante al menos 12 meses después de la aplicación de pesticidas. No para uso en céspedes.
CÓMO USAR	1. Medir la circunferencia del tronco del árbol, la altura del arbusto o determinar el tamaño del contenedor. 2. Medir y verter la cantidad necesaria de producto en un balde de agua. 3. Verter la solución alrededor de la base del árbol o arbusto o en el contenedor.
CUÁNTO USAR	Árboles: 1 onza (30 g) por cada pulgada (2,5 cm) de distancia alrededor del tronco; trata 4 árboles que midan 8 pulgadas (20 cm) de circunferencia. Arbustos: 3 onzas (90 g) por cada pie (30 cm) de altura; trata 5 arbustos que midan 2 pies (60 cm) de altura. Plantas de almacigo: 1 2/3 de cucharada por cada contenedor de 5 galones (19 litros); trata hasta 42 contenedores de 5 galones (20 litros).
	Para hacer preguntas o comentarios, llamar al número gratuito 1-877-229-3724 o visite nuestra página Web a www.BioAdvanced.com .

INDICACIONES DE USO

Es una violación de la Ley Federal utilizar este producto de manera contraria a la indicada en la etiqueta. Antes de usar, lea y siga las indicaciones de uso.

ANTES DE USAR Leer y seguir las indicaciones de uso.

Restricciones • No aplicar cerca de lagos, arroyos, ríos o estanques. • No aplicar en suelos anegados o saturados. • Los utensilios de medición, como tazas o cucharas, no deben utilizarse con alimentos ni bebidas luego de ser utilizados con este producto.

(continuación)

INDICACIONES DE USO (continuación)

ANTES DE USAR (continuación)

Restricciones • No aplique cuando las abejas buscan su comida en el área. • Los niños y mascotas pueden volver a ingresar al área tratada después de que se haya secado. • No aplicar este producto, mediante ningún método de aplicación, sobre tilo, tilo americano u otra especie de Tilia. • No para uso en céspedes.



CÓMO USAR

Determinar la cantidad a utilizar midiendo la circunferencia del tronco del árbol o la altura del arbusto. Verter la cantidad necesaria de este producto en un balde de agua y vaciarlo alrededor de la base del árbol o arbusto. Para las plantas de almácigo, determinar el tamaño del contenedor y verter la cantidad necesaria de producto en agua suficiente para humedecer bien la tierra para plantar pero sin causar la pérdida de agua desde el fondo del contenedor.

PARA USAR EN

Árboles ornamentales de exterior, arbustos, y plantas en macetas que no son destinados para el uso comestible. Árboles, arbustos y plantas de almácigo de exteriores no destinados al uso comestible. Este producto está destinado sólo a árboles sin frutos o sin frutos secos. Las plantas sin frutos y sin frutos secos son plantas que no poseen frutos comestibles y frutos secos durante al menos 12 meses después de la aplicación de pesticidas.

CONTROLA

Adélgidos	Salzarillas (incluso la chicharrita de las alas cristalinas)
Áfidos	Minadores de las hojas (incluso minadores de las
Escamas blindadas (supresión)	hojas del abedul y del boj)
Barrenadores	Cocos
de cabeza redondeada (incluso los pirales	Larvas de polillas de la punta del pino
con cuernos del eucalipto y escarabajo	Psílidos
asiático de cuernos largos)	Chinchies de la palmera real
de cabeza plana (incluso pirales dorados,	Larvas de gorgojos de raíz (incluso el gorgojo
barrenadores del abedul y esmeraldas del fresno)	negro de entredadera)
Escarabajos de la corteza del pino (incluso	Larvas del himenóptero diprionido
escarabajos de Ips) (supresión)	Cochinillas blandas (incluso escamas lobuladas
Orugas (incluso las polillas gitanas, orugas de otoño	de laca)
y orugas carpas)	Trips
Larvas de moscas de los hongos	Mosca blanca
Escarabajos japoneses, adultos	Larvas de gusanos blancos (tales como
Chinche de encaje	escarabajos japoneses, cetonias, gusano blanco
Escarabajos de la hoja (incluso escarabajos de la	européo, escarabajo oriental, escarabajo de
hoja del olmo, de las hojas de viburnum y	jardín asiático)
de la hoja del iris)	

CUÁNTO APLICAR

ÁRBOLES

Medir la circunferencia del tronco del árbol en pulgadas (1 pulgada = 2,5 cm) a aproximadamente 4,5 pies (1,35 m) desde el nivel del suelo. Esta medición es la cantidad de onzas de producto a agregar a 1 galón (4 litros) de agua.

Ejemplo: para un árbol que mide 8 pulgadas (20 cm) de diámetro, verter 8 onzas (230 g) de producto en 1 galón (4 litros) de agua. Si el árbol mide más de 50 pulgadas (1,30 m) de diámetro, verter el producto necesario en 2 galones (8 litros) de agua. La medición con una cinta flexible, u otro elemento de medición, es el método más recomendado para medir la circunferencia del árbol.

ÁRBOLES CON 2 O MÁS TRONCOS

Mida la distancia en pulgadas de la circunferencia de cada tronco del árbol a 4,5 pies (1,20 m) aproximadamente del nivel del suelo, sume todos, y multiplique por 0,75. Esta medida es el número de onzas del producto que debe agregar en 1 galón (4 litros) de agua.

Ejemplo: Un árbol de 4 troncos. Miden 20,10, 5 y 5 (pulgadas) (50, 25, 12, 12 cm) o un total de 40 pulgadas (1 m). 40 x 0,75 = 30 onzas del producto en 1 galón (4 litros) de agua. Si se requiere 50 (alrededor de 1,5 l) o mayor cantidad de onzas del producto, dilúyalo en 2 galones (8 litros) de agua.

ARBUSTOS

Medir la altura del arbusto hasta el pie más cercano. Multiplicar la cantidad de pies por 3 – ésta es la cantidad de onzas de producto a agregar a 1 galón (4 litros) de agua.

(continuación)

INDICACIONES DE USO (continuación)

CUÁNTO APLICAR (continuación)

PLANTAS DE ALMÁCIGO

Tamaño del contenedor	Cantidad de producto necesaria
1 galón (4 litros)	1 cucharadita
2 galones (8 litros)	2 cucharaditas
3 galones (12 litros)	1 cucharada
5 galones (19 litros)	1 2/3 cucharadas
10 galones (38 litros)	3 1/3 cucharadas
15 galones (56 litros)	5 cucharadas
20 galones (75 litros)	6 4/3 cucharadas

Verter el producto necesario en agua suficiente para humedecer bien la tierra para plantar. Para asegurarse que las raíces absorban el insecticida, no regar excesivamente los primeros 10 días.

Nota: 3 cucharaditas = 1 cucharada 2 cucharadas = 1 onza líquida (30 cc)

Restricciones: No realizar más de una aplicación por año. Independientemente de la fórmula o tipo de aplicación, NO aplicar más de un total de 0,4 libras (180 g) de clotianidina por acre (4050 m²)

CÓMO APLICAR

Árboles y arbustos:

- Llene un balde o regadera con 1 galón (4 litros) de agua. Para los árboles con circunferencia mayor a 50" (1,30 m aprox.), use 2 galones (8 litros) de agua.
- Mezcle bien la botella.
- Mida cuidadosamente la cantidad necesaria del producto en un balde.
- Vierta lentamente la solución en forma pareja alrededor del árbol. Para obtener mejores resultados, vierta el producto lo más cerca posible del TRONCO/principal tallo del árbol/arbusto.
- Llene el balde con agua limpia y viértala también alrededor del tronco.

Plantas de almácigo:

- Aplicar la solución uniformemente sobre la tierra para plantar y regar bien.
- Durante los primeros 10 días, evitar inundar el contenedor hasta el punto de hacer drenar el agua por la base.
- Para las plantas de almácigo de interiores, sacarlas afuera, aplicarles el tratamiento y regresarlas al interior cuando no tengan exceso de agua.

Indicaciones adicionales:

- Retire el mantillo y la franja de malezas antes de la aplicación del producto.
- Use este producto como parte de un programa de mantenimiento del cuidado de la salud de árboles y arbustos antes de que aparezca el problema. Este producto puede aplicarse en cualquier momento salvo cuando el suelo esté anegado o congelado. Estas condiciones impiden que el producto llegue a la zona de la raíz. Durante periodos prolongados de sequía, empape bien con agua el suelo alrededor del árbol o el arbusto la noche antes de realizar la aplicación.
- Para infestaciones graves, trate el lugar con un insecticida foliar tal como BioAdvanced® 3-in-1 Insect, Disease & Mite Control Concentrate, luego use este producto como parte de un programa de mantenimiento de cuidado habitual.

CÓMO FUNCIONA

El insecticida y fertilizante disueltos en agua desciende a través del suelo donde las raíces lo absorben. Una vez absorbido, asciende por el árbol o arbusto proporcionando protección contra los insectos y fertilización durante todo el año. Este producto incluso ingresa en los nuevos brotes después de la aplicación y de este modo también los protege. Para obtener resultados completos, el insecticida y fertilizante se debe distribuir por completo en el árbol o arbusto. Según el tamaño y la salud de la planta, esto puede tomar de una semana a tres meses (para árboles muy grandes). Ni la lluvia ni el agua pueden lavar esta protección interna y fertilización.



NOTA: Es posible que la aplicación en árboles muy infestados no pueda evitar su eventual pérdida debido al daño ocasionado por plagas existentes y el estrés del árbol.

INDICACIONES PARA ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA

Almacenar en el contenedor original y en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños, preferentemente en un armario bajo llave. Proteger del congelamiento.

ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA

Si está vacío: • Contenedor no reusable. No volver a rellenar ni utilizar este contenedor. • Enjuague bien el envase vacío del producto y vierta el agua del enjuague alrededor del árbol o arbustos como parte de la aplicación. • Colocar el contenedor vacío en la basura o entregarlo para reciclar si fuera posible.

Si está parcialmente lleno: • Llamar a la agencia local de residuos sólidos o al número gratuito 1-877-229-3724 para solicitar indicaciones para la eliminación. • Nunca colocar el producto sin utilizar debajo de algún desagüe interno o externo.

(continuación)

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN Riesgos para seres humanos y animales domésticos

- Perjudicial si se absorbe por la piel. Perjudicial si se ingiere.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Lavarse prolijamente con agua y jabón después de manipular este producto y antes de comer, beber, masticar goma de masar o usar tabaco.
- Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usar.

PRIMEROS AUXILIOS +

Insecticida neonicotinoide

EN CASO DE INGESTIÓN

- Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento.
- Hacer que la persona beba tragos de agua, si puede tragar.
- No inducir el vómito a menos que lo indique el médico o el centro de control de envenenamiento.
- No administrar nada por boca a una persona inconsciente.

EN CASO DE INHALACIÓN

- Trasladar a la persona a un lugar fresco.
- Si hay paro respiratorio, llamar al 911 o a una ambulancia, luego proporcionar respiración artificial, preferentemente de boca a boca, si fuera posible.
- Llamar a un médico o un centro de control de envenenamiento para mayores consultas sobre el tratamiento.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA

- Quitar la ropa contaminada.
- Enjuagar la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 a 20 minutos.
- Llamar a un médico o a un centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS

- Mantener los ojos abiertos y enjuagar lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos.
- Retirar los lentes de contacto, si los hubiera, después de los primeros 5 minutos, y luego continuar enjuagando los ojos.
- Llamar a un médico o a un centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento.

NOTA: Tener a mano el contenedor o la etiqueta del producto al llamar a un centro de control de envenenamiento o a un médico, o al concurrir a un tratamiento.
Para solicitar información médica de emergencia, llamar al número 877-229-3763.
Ingredientes activos: 0,74% Imidacloprida (CAS # 138261-41-3) y 0,37% Clotianidina (CAS # 210880-92-5).

RIESGOS AMBIENTALES

- Este pesticida es tóxico para los invertebrados acuáticos. La deriva y el escurrimiento pueden ser peligrosos para los organismos acuáticos en áreas circundantes. No aplique donde pueda haber escurrimiento.
- Para proteger el medio ambiente, no permitir que el pesticida ingrese o se escurra en las bocas de tormenta, zanjas, alcantarillas o aguas superficiales. Aplicar este producto cuando el clima esté calmo y no haya probabilidad de lluvia para las 24 horas siguientes ayudará a garantizar que el viento o la lluvia no dispersen o escurran el pesticida del área de tratamiento. Enjuagar el equipo de aplicación sobre el área tratada ayudará a evitar que ingrese en cursos de agua o sistemas de desagüe.
- Este producto es altamente tóxico para las abejas expuestas a un tratamiento directo o a residuos en cosechas florecientes o malezas. No aplique este producto o deje que la deriva llegue a las cosechas florecientes o malezas si las abejas visitan el área bajo tratamiento.

NOTA: Investigaciones y pruebas han determinado que las "Indicaciones de uso" son las adecuadas para el uso apropiado de este producto bajo las condiciones previstas. El Comprador asume la responsabilidad, en la medida que sea acorde con la ley pertinente por la falta de rendimiento o seguridad si no es utilizado de acuerdo con las indicaciones.

Garantía de devolución de dinero: 100% de satisfacción garantizada o le devolvemos su dinero.