



NATRIA®

DISEASE CONTROL

READY-TO-SPRAY

**For use on Lawns, Roses, Vegetables,
Fruits, Trees, & Shrubs**

Para usar en jardines, rosas, hortalizas, frutas, árboles y arbustos

- Controls Brown Patch, Dollar Spot, & other listed diseases
- Promotes Healthy, Disease-Free Lawns



KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION See back panel for additional precautionary statements

Active Ingredients:
 QST 713 strain of dried *Bacillus subtilis** 1.34%
 Other Ingredients 98.66%
 Total 100.00%
 *contains a minimum of 1 x 10⁹ cfu/g

79868464b 130208AV1

Treats up to 7,000 Sq Ft

NET CONTENTS 28 FL OZ (828ml)



PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION

- Harmful if inhaled. Avoid breathing spray mist.
- Remove and wash contaminated clothing before reuse.

FIRST AID +

**IF
INHALED**

- Move person to fresh air.
- If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth, if possible.
- Call a poison control center or doctor for further treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment.

NOTE: For medical emergency information, you may call toll free 1-877-229-3763.

Conditions for sale and Warranty:

Except to the extent prohibited by applicable law, Bayer Advanced offers this product with the following conditions: 1) buyers and users of this product assume the risk of any storage, handling or use contrary to the label and directions and 2) Bayer's liability shall in no case exceed the purchase price of the product.

Money Back Guarantee: If you are not satisfied with this product, we will gladly refund your original purchase price.

EPA Reg. No. 264-1161-72155

EPA Est. No indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package.
(65) = 432-TX-1 (EL) = 000264-MEX-001

Distributed by: Bayer Advanced
A Business Unit of Bayer CropScience LP
P.O. Box 12014, 2 T.W. Alexander Drive
Research Triangle Park, NC 27709
Made in Mexico

Bayer (reg'd) Bayer Cross (reg'd), Bayer Advanced™
and Natria® are trademarks of Bayer.

PRESS TO RESEAL

79856717c 130208AV1a

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN (continuación)

ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA Y MANIPULACIÓN DEL CONTENEDOR

Contenedor no reusable. No volver a utilizar ni rellenar este contenedor.
Si está vacío:
 • Colocarlo en la basura o entregarlo para reciclar si fuera posible.
Si está parcialmente lleno:
 • Llamar a la agencia local de residuos sólidos o al número 1-877-229-3724 para solicitar indicaciones para la eliminación. Nunca colocar el producto sin utilizar debajo de algún desagüe interno o externo.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN PELIGROS AMBIENTALES

Para proteger el medio ambiente, no permitir que el pesticida ingrese o se escurra en las bocas de tormenta, zanjas, alcantarillas o aguas superficiales. Aplicar este producto cuando el clima esté calmo y no haya probabilidad de lluvia para las 24 horas siguientes, ayudará a garantizar que el viento o la lluvia no dispersen o escurran el pesticida del área de tratamiento. Enjuagar el equipo de aplicación sobre el área tratada ayudará a evitar que ingrese en cursos de agua o sistemas de desagüe.

PELIGROS PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS PRECAUCIÓN

- Es perjudicial si se inhala. Evitar respirar la bruma del rocío.
- Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usar.

PRIMEROS AUXILIOS †

EN CASO DE INHALACIÓN

- Trasladar a la persona a un lugar fresco.
- Si hay paro respiratorio, llamar al 911 o a una ambulancia, luego proporcionar respiración artificial, preferentemente de boca a boca, si fuera posible.
- Llamar a un médico o un centro de control de envenenamiento para mayores consultas sobre el tratamiento.

Tener el contenedor o la etiqueta del producto a mano al llamar a un médico, a un centro de control de envenenamiento o al concurrir a un tratamiento.

NOTA: Para solicitar información médica de emergencia, llamar al número gratuito 1-877-229-3763.

Condiciones de venta y garantía:

Excepto en la medida que lo prohíba la ley pertinente, Bayer Advanced ofrece este producto con las siguientes condiciones: 1) los compradores y usuarios de este producto asumen el riesgo de cualquier almacenamiento, manipulación o uso de manera contraria a la etiqueta e indicaciones y 2) la responsabilidad de Bayer en ningún caso excederá el precio de compra del producto.

Garantía de devolución de dinero: Si usted no está satisfecho con el producto, gustosamente le reembolsaremos el monto original del precio de compra.



DISEASE CONTROL
READY-TO-SPRAY

OPEN
Resealable Label
for Directions &
Precautions

This product is a broad spectrum, preventative biofungicide recommended for the control or suppression of many important plant diseases. It may be used on Lawns, Roses, Vegetables, Fruits, Flowers, Trees & Shrubs. Easy, attach hose and spray.

READ THE LABEL FIRST!



Indicaciones
en español
después de las
de inglés

QUICK FACTS

- Prevents and Controls Harmful Lawn and Garden Diseases
- Apply Any Time of Day - Will Not Burn or Injure Leaves or Lawns
- Promotes Greener, Healthy Disease-Free Lawns
- For Organic Lawn Care • For Organic Gardening

| | |
|---|--|
| DISEASES CONTROLLED OR SUPPRESSED: | Anthrachnose, Black Mold, Black Spot, Botrytis, Brown Patch, Dollar Spot, Downy Mildew (suppression), Late Blight (suppression), Leaf Spots, Rust, Powdery Mildew, and Scab (suppression). |
| COVERAGE | For Lawns: Treats up to 7,000 sq ft For Other Uses: Makes up to 14 gallons finished spray. |
| WHERE TO USE | For use on lawns, roses, vegetables, fruits, flowers, trees & shrubs. |
| WHEN TO USE | For best results, treat prior to foliar disease development or at the first sign of foliar disease infection. Repeat at 7-day intervals. |
| HOW MUCH TO USE | No Mixing or Measuring is needed. Dilutes automatically as you spray. Spray plant to run-off. |
|  | For questions or comments, call toll-free 1-877-BayerAG (1-877-229-3724) |

FOR HOME, GARDEN AND LAWN USE

| | | |
|---|---------|---|
| ACTIVE INGREDIENT: QST 713 strain of dried <i>Bacillus subtilis</i> * | 1.34% | * Contains a minimum of 1x10 ⁹ CFU/g |
| OTHER INGREDIENTS | 98.66% | |
| TOTAL | 100.00% | |

EPA Reg. No. 264-1161-72155
 EPA Est. No indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package. (65) = 432-TX-1
 (EL) = 000264-MEX-001



DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal Law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

GENERAL USE INFORMATION

This product is a broad spectrum, preventative biofungicide recommended for the control or suppression of many important plant diseases. It may be used on lawns, vegetables, fruits, nuts, flowers, foliage, trees, and shrubs located in residential landscapes.

BEFORE YOU USE

Read and follow these directions when using:

- Do not allow spray to drift from application site.

FOR BEST RESULTS

- Shake well before use.
- Spray to ensure thorough coverage.
- Repeat at 7-day intervals or as needed.
- Under conditions of high disease pressure, shorten the spray interval.

HOW TO USE

FOR VEGETABLES, FRUITS, NUTS, FLOWERS, FOLIAGE, TREES, AND SHRUBS

1. Shake container well before using.
 2. Make sure the nozzle is in the "OFF" position with the safety tab in the valve notch.
 3. Securely attach a garden hose to the hose-end spray nozzle, tightening nozzle.
 4. To begin spraying, point nozzle at the area to be treated and bend the safety tab back while turning the dial clockwise. The water will automatically start mixing and spraying.
 5. Spray plant to run-off, thoroughly covering both top and bottom surface of foliage to ensure thorough coverage.
 6. To turn the sprayer off, turn the dial in the opposite direction (counter-clockwise) until the water stops flowing and the safety tab engages. Turn the water off at the faucet. To relieve pressure before detaching sprayer, bend the safety tab back and turn the dial on (clockwise) until the water stops spraying. Then, turn the dial back to the off position until the safety tab engages.
 7. Detach the hose-end sprayer from the hose and store the unused product in a cool, dark place until its next use.
- This product can be used on the day of harvest and on all fruits and vegetables used in canning.

(continued)

DIRECTIONS FOR USE (cont'd)

FOR LAWNS

HOW TO USE

1. Shake container well before using.
2. Make sure the nozzle is in the "OFF" position with the safety tab in the valve notch.
3. Securely attach a garden hose to the hose-end spray nozzle, tightening nozzle.
4. Calculate the square feet of the area to be treated by multiplying length by width. 4 fl. oz. of this product will treat 1000 square feet of lawn.
5. Turn on water at faucet. Extend hose to the farthest area to be treated and work backward toward the faucet.
6. To begin spraying, point nozzle at the lawn to be treated and bend the safety tab back while turning the dial clockwise. The water will automatically start mixing and spraying. Walk backwards at a steady pace sweeping the spray in an overlapping motion to cover the area to be treated. Refer to the sight gauge on the side of the bottle to guide coverage (example: when 1 fl. oz. of spray has been used, you should have covered 250 square feet of lawn.)
7. To turn the sprayer off, turn the dial in the opposite direction (counter-clockwise) until the water stops flowing and the safety tab engages. Turn the water off at the faucet. To relieve pressure before detaching sprayer, bend the safety tab back and turn the dial on (clockwise) until the water stops spraying. Then turn the dial back to the off position until the safety tab engages.
8. Detach the hose-end sprayer from the hose and store the unused product in a cool, dark place until its next use.

USE SITE

VEGETABLES, FRUITS, NUTS, FLOWERS, FOLIAGE, TREES, AND SHRUBS

DISEASES CONTROLLED OR SUPPRESSED

Anthraxnose, Bacteria (*Erwinia* spp., *Pseudomonas* spp., *Xanthomonas* spp.), Bacterial Leaf Blight, Bacterial Speck, Bacterial Spot (suppression), Bean Rust (suppression), Black Mold, Black Rot, Black Crown Rot, Black Spot of Rose, Botrytis, Botrytis Leaf Blight, Botrytis Neck Rot, Downy Mildew (suppression), Early Blight (suppression), Fire Blight (suppression), Gray Mold, Greasy Spot (suppression), Late Blight (suppression), Leaf Spots, Onion Downy

(continued)

DIRECTIONS FOR USE (cont'd)

| USE SITE | DISEASES CONTROLLED OR SUPPRESSED |
|--|--|
| VEGETABLES, FRUITS, NUTS, FLOWERS, FOLIAGE, TREES, AND SHRUBS (cont'd) | Mildew, Onion Purple Blotch, <i>Phytophthora</i> spp., Pin Rot (suppression), Powdery Mildew, Rust, Scab (suppression), Sclerotinia Head and Leaf Drop, Sour Rot, Target Spot, Walnut Blight and White Mold (suppression). |
| LAWNS | Brown Patch, Dollar Spot, Powdery Mildew, Rust, Anthracnose. |

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal.

PESTICIDE STORAGE Store in original container only, out of reach of children. Keep container closed when not in use. Store at room temperature.

PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container.

If Empty:

- Place in trash or offer for recycling if available.

If Partly Filled:

- Call your local solid waste agency or call 1-877-229-3724 for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.



PRECAUTIONARY STATEMENTS

ENVIRONMENTAL HAZARDS

To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid run off to water bodies or drainage systems.

¡LEER LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO!

DATOS RÁPIDOS

- **Previene y controla las enfermedades dañinas del césped y el jardín**
- **Aplicar en cualquier momento del día: no quema ni daña las hojas y el césped**
- **Estimula céspedes más verdes, sanos y libres de enfermedades**
- **Para cuidado orgánico del jardín • Para jardinería orgánica**

| | |
|---|---|
| ENFERMEDADES QUE CONTROLA O SUPRIME | Antracnosis, moho negro, mancha negra, botritis, parche marrón, mancha de dólar, mildiu lanoso (supresión), tizón tardío (supresión), manchas de la hoja, roya, mildiu polvoriento y sarna (supresión). |
| COBERTURA | Para césped: trata hasta 7,000 pies cuadrados (630 metros cuadrados) Para otros usos: rinde hasta 14 galones (55 litros) de rocío terminado. |
| DÓNDE USAR | Para usar sobre el césped, rosas, hortalizas, frutas, flores, árboles y arbustos. |
| CUÁNDO USAR | Para obtener mejores resultados, tratar antes del desarrollo de las enfermedades foliares o ante el primer signo de infección por enfermedad foliar. Repetir a intervalos de 7 días. |
| CUÁNTO USAR | No es necesario mezclar ni medir. Se diluye automáticamente a medida que rocía. Rocía las plantas hasta que el producto se escurra. |
|  | Para hacer preguntas o comentarios, llamar al número gratuito 1-877 BayerAG (1-877-229-3724) |

INGREDIENTE ACTIVO:

QST 713 cepa de *Bacillus subtilis** seco 1.34%

OTROS INGREDIENTES 98.66%

TOTAL 100.00%

* Contiene un mínimo de 1x10⁹ de CFU/g

PARA USAR EN EL HOGAR, JARDÍN Y CÉSPED

INDICACIONES DE USO

Es una violación de la Ley Federal utilizar este producto de manera contraria a la indicada en la etiqueta.

INFORMACIÓN GENERAL DE USO

Este producto es un biofungicida preventivo de amplio espectro recomendado para el control o la supresión de muchas enfermedades importantes de las plantas. Puede utilizarse sobre el césped, hortalizas, frutas, frutos secos, flores, follaje, árboles y arbustos ubicados en jardines residenciales.

ANTES DE USAR

Leer y seguir estas indicaciones de uso:

- No permitir que el rocío se disperse del lugar de aplicación.

(continuación)

INDICACIONES DE USO (continuación)

PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS

- Agitar bien antes de usar.
- Repetir a intervalos de 7 días o según sea necesario.
- En condiciones de alta incidencia de la enfermedad, reducir los intervalos de rocío.
- Rocíar para asegurar la cobertura completa.

PARA HORTALIZAS, FRUTAS, FRUTOS SECOS, FLORES, FOLLAJE, ÁRBOLES Y ARBUSTOS

1. Agitar bien el contenedor antes de usar.
 2. Asegurarse de que la boquilla esté en la posición "OFF" (cerrado) con la lengüeta de seguridad en la ranura de la válvula.
 3. Conectar con firmeza una manguera de jardín a la boquilla de rocío para manguera y ajustar la boquilla.
 4. Para comenzar a rocíar, apuntar la boquilla al área a tratar y doblar hacia atrás la lengüeta de seguridad mientras gira el disco en el sentido de las agujas del reloj. Automáticamente el agua se comenzará a mezclar y a rocíar.
 5. Rocíar la planta hasta que se escurra, cubriendo bien la superficie superior e inferior del follaje para asegurar una cobertura completa.
 6. Para cerrar el rociador, girar el disco en la dirección opuesta (en el sentido contrario a las agujas del reloj) hasta que el agua deje de fluir y la lengüeta de seguridad se acople. Cerrar el grifo de agua. Para reducir la presión de agua antes de desconectar el rociador, doblar hacia atrás la lengüeta de seguridad y girar el disco hacia la posición de abierto (en el sentido de las agujas del reloj) hasta que el agua deje de rocíar. Luego, girar el disco nuevamente a la posición de cierre hasta que la lengüeta de seguridad se acople.
 7. Desconectar el rociador de la manguera y almacenar el producto sin utilizar en un lugar fresco y oscuro hasta el próximo uso.
- Este producto se puede utilizar el día de la cosecha en todas las frutas y hortalizas que se utilizan para conserva.

CÓMO USAR

PARA EL CÉSPED

1. Agitar bien el contenedor antes de usar.
2. Asegurarse de que la boquilla esté en la posición "OFF" (cerrado) con la lengüeta de seguridad en la ranura de la válvula.
3. Conectar con firmeza una manguera de jardín a la boquilla de rocío para manguera y ajustar la boquilla.
4. Para calcular los pies cuadrados (metros cuadrados) del área a tratar, multiplicar el largo por el ancho. 4 onzas líquidas (120 cc) de este producto tratan 1000 pies cuadrados (90 metros cuadrados) de césped.
5. Abrir el grifo de agua. Extender la manguera hasta el área más lejana a tratar y trabajar de espaldas hacia el grifo.
6. Para comenzar a rocíar, apuntar la boquilla al césped a tratar y doblar hacia

(continuación)

INDICACIONES DE USO (continuación)

PARA EL CÉSPED (continuación)

atrás la lengüeta de seguridad mientras gira el disco en el sentido de las agujas del reloj. Automáticamente el agua se comenzará a mezclar y a rocíar. Caminar hacia atrás a paso lento constante y a medida que rocía emplear un movimiento de barrido parejo y de superposición para cubrir el área a tratar. Consultar el indicador visual al costado de la botella para guiar la cobertura (ejemplo: cuando se ha utilizado 1 onza líquida (30 cc) de rocío, debe haber cubierto 250 pies cuadrados de césped (23 metros cuadrados)).

7. Para cerrar el rociador, girar el disco en la dirección opuesta (en el sentido contrario a las agujas del reloj) hasta que el agua deje de fluir y la lengüeta de seguridad se acople. Cerrar el grifo de agua. Para reducir la presión de agua antes de desconectar el rociador, doblar hacia atrás la lengüeta de seguridad y girar el disco hacia la posición de abierto (en el sentido de las agujas del reloj) hasta que el agua deje de rocíar. Luego, girar el disco nuevamente a la posición de cierre hasta que la lengüeta de seguridad se acople.
8. Desconectar el rociador de la manguera y almacenar el producto sin utilizar en un lugar fresco y oscuro hasta el próximo uso.

CÓMO USAR (continuación)

| LUGARES DE USO | ENFERMEDADES QUE CONTROLA O SUPRIME |
|---|--|
| HORTALIZAS, FRUTAS, FRUTOS SECOS, FLORES, FOLLAJE, ÁRBOLES Y ARBUSTOS | Antracnosis, bacterias (<i>Erwina</i> spp., <i>Pseudomonas</i> spp., <i>Xanthomonas</i> spp.), tizón bacteriano de la hoja, peca bacteriana, mancha bacteriana (supresión), roya del frijol (supresión), moho negro, podredumbre negra de la raíz, podredumbre negra de la corona, mancha negra de la rosa, botritis, tizón de la hoja por botritis, pudrición del cuello por botritis, mildiu lanoso (supresión), tizón temprano (supresión), tizón de fuego (supresión), moho gris, mancha grasosa (supresión), tizón tardío (supresión), manchas de la hoja, mildiu lanoso de la cebolla, mancha púrpura de la cebolla, <i>Phytophthora</i> spp., podredumbre de la raíz (supresión), mildiu polvoriento, roya, sarna (supresión), caída de hojas y corona por sclerotinia, podredumbre agria, mancha anillada, tizón del nogal y moho blanco (supresión). |
| CÉSPED | Parche marrón, mancha de dólar, mildiu polvoriento, roya, antracnosis. |

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contaminar el agua, la comida o los alimentos al almacenar o eliminar el producto.

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA

Almacenar solamente en el contenedor original, fuera del alcance de los niños. Mantener el contenedor cerrado cuando no se utiliza. Almacenar a temperatura ambiente.

(continuación)