



NATRIA™

MULTI-INSECT CONTROL

CONCENTRATE

**For use on Roses, Flowers,
Fruits & Vegetables**

Para usar sobre rosas, flores, arbustos, frutas y hortalizas

- **Kills all Stages of Insects including Eggs
PLUS controls Powdery Mildew**
- **Protects against Spider Mites**



**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION** See back panel for additional
precautionary statements

Active Ingredient: 96%
Canola Oil 4%
Other Ingredients 4%
Total 100%
This product contains 7.368 Lbs
of Active ingredient per gallon

NET CONTENTS 32 FL OZ (946ml)



79661460 R.0



MULTI-INSECT CONTROL CONCENTRATE

*This product based on plant oils is ideal for fruits, vegetables, roses, and flowers.
It can be used as a dormant and growing season spray, to control all stages of insects.*

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION

- Avoid contact with skin or clothing.
- Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, or using tobacco.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid run off to water bodies or drainage systems.

FIRST AID +

IF ON SKIN OR CLOTHING

- Take off contaminated clothing.
- Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.
- Call a poison control center or doctor for treatment advice.

NOTE: For medical emergency information, you may call toll free 1-877-229-3763. Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment

WARRANTY:

To the extent consistent with applicable law, seller warrants that this product conforms to the chemical description on this label and is reasonably fit for purposes stated on this label only when used in accordance with directions under normal use conditions. To the fullest extent permitted by law, the seller shall not be liable for damages caused by buyer's use of product contrary to label directions, or under abnormal use conditions, or under conditions not reasonably foreseeable to seller. To the extent consistent with applicable law, seller makes no other warranties, either expressed or implied.

Money Back Guarantee: If you are not satisfied with this product, we will gladly refund your original purchase price.

Reg. No. 67702-4-72155

EPA Est. No. indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package.

(47) = 52251-OR-005 (65) = 432-TX-1 (13) = 071106-GA-001

(49) = 072155-AL-001

Distributed by: Bayer Advanced
A Business Unit of Bayer CropScience LP
P.O. Box 12014, 2 T.W. Alexander Drive
Research Triangle Park, NC 27709



Sold under License of W. Neudorff GmbH KG

Bayer (reg'd) Bayer Cross (reg'd), Bayer Advanced™ and Natria™ are trademarks of Bayer.

PRESS TO RESEAL

79627114 R0

READ THE LABEL FIRST!

Indicaciones
en español
después de las
de inglés

OPEN
Resealable Label
for Directions &
Precautions

QUICK FACTS

- **Kills All Stages of Insects, Including Eggs, Plus Controls Powdery Mildew**
- **Protects Against Spider Mites**
- **For Year-Round Use**
- **For Organic Gardening**



KILLS	Adelgids, aphids, mites, leafhoppers, mealybugs, scale, phylloxera, psyllids, immature plant bugs, sawfly larvae, whiteflies, and controls powdery mildew.
COVERAGE	Will treat 1296 square feet.
WHERE TO USE	On listed fruit trees, vegetables, ornamentals, and shade trees.
WHEN TO USE	When insects, insect damage, or powdery mildew first appears.
HOW MUCH TO USE	4 teaspoons in 1 quart of water (or 2 fl. oz. concentrate with 3 quarts of water).
	For questions or comments, call toll-free 1-877-BayerAG (1-877-229-3724).

FOR USE IN HOME GARDENS, AND HOME GREENHOUSES

ACTIVE INGREDIENT:

Canola Oil 96%

OTHER INGREDIENTS 4%

TOTAL 100%

EPA Reg. No. EPA Reg. No. 67702-4-72155

EPA Est. No. indicated by 3rd and 4th digits
of the batch number on this package.

(47) = 52251-OR-005 (65) = 432-TX-1

(13) = 071106-GA-001 (49) = 072155-AL-001



79627114 R.0

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal Law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

BEFORE YOU USE	• Please read entire label. Use only as directed. • Shake well before each use. • Thoroughly wet all parts of the pests and plants. • Repeat treatment in 1 – 2 weeks if needed.
HOW TO USE	For 2% formulation: mix 4 teaspoons of concentrate with 1 quart of water (or 2 fluid oz. concentrate with 3 quarts water). Shake well before each use and stir or shake diluted spray frequently during use. Apply one quart of formulation for 3 square yards. Apply at a rate of 2% formulation. Using hand-held trigger sprayers, hand sprayers or backpack sprayers, thoroughly spray insect pests with diluted product until plants are wet. Repeat treatment in 1-2 weeks if needed. Apply one quart of formulation for 3 square yards.
FOR USE ON	VEGETABLES: Beans, Cabbage, Corn, Cucurbits, Melons, Peas, Potatoes, Soybeans, Tomatoes FRUITS & NUTS: Apples, Cherries, Citrus, Figs, Grapes, Pears, Nuts, Raspberries, Strawberries ORNAMENTAL AND SHADE TREES: Birch, Evergreens, Holly, Oak Houseplants; Flowering, Foliage and Bedding Plants.
POWDERY MILDEW CONTROL	For control of powdery mildew on fruits, vegetables, roses, shrubs, houseplants and ornamentals: Thoroughly apply to both upper and lower leaf surfaces. Continue every 7-14 days as needed until disease is eliminated.
DIRECTIONS FOR DORMANT USE	Controls egg stages of pests present in dormant season and scale insects, mites and mealybugs on dormant shrubs (such as roses), evergreens, woody plants, fruit trees and shade trees. For dormant use apply a 2% formulation, mix 4 teaspoons of concentrate with 1 quart water (or 2 fluid ounces concentrate with 3 quarts water). Thoroughly wet the dormant plants or trees.
USE PRECAUTIONS	Oil removes the glaucous (blue) bloom from such evergreens as Colorado blue spruce and Koster spruce. Use caution on blooms and buds and on oil sensitive plants such as: Chamaecyparis, Cryptomeria, Japanese Holly, Red Cedar and Smoke Tree. If concerned about sensitivity of plants, test spray a portion of the plant and wait several days to determine if burn occurs before spraying larger areas. (continued)

DIRECTIONS FOR USE (cont'd)

USE PRECAUTIONS (cont'd)	Do not combine with sulfur and do not follow a previous application of sulfur or apply sulfur following an application of this material until sufficient time has elapsed for safety (at least 30 days). When used in combination with or immediately before or after spraying, this product may increase the phytotoxicity of dinitro compounds, or fungicides such as Captan, Folpet, Karathene and Morestan, or copper compounds. If in doubt, treat a small area with a combination spray and wait several days to determine if burn occurs. Do not use this product when temperatures are above 90°F. When temperatures drop below 32°F during the night, do not spray tree and vine crops until daytime temperatures have warmed to a point above 35°F and crops are free from moisture due to melting frost or heavy dews. Use of this product on citrus after October 1 is capable of increasing the tree's susceptibility to cold damage.
---------------------------------	--

STORAGE & DISPOSAL

STORAGE	• Store this product in it's original container and keep in a secure storage area, out of reach of children and domestic animals.
DISPOSAL	If Empty: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Place in trash or offer for recycling if available. If Partly Filled: Call your local solid waste agency or call 1 877-229-3724 for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

¡LEER LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO!

DATOS RÁPIDOS

- Mata todas las etapas de los insectos, incluso los huevos y además controla el mildiu polvoriento
- Protege de los ácaros araña
- Para utilizar durante todo el año
- Para jardinería orgánica

MATA	Adélgidos, áfidos, ácaros, saltarillas, cocos, escamas, filoxeras, psílidos, chinches inmaduras de las plantas, larvas del heminóptero diprionido, moscas blancas y controla el mildiu polvoriento.
COBERTURA	Tratará 1296 pies cuadrados (120 metros cuadrados).
DÓNDE USAR	Sobre árboles frutales de la lista, hortalizas, árboles ornamentales y árboles que proporcionan sombra.
CUÁNDO USAR	Cuando aparecen los primeros insectos, daños producidos por insectos o el mildiu polvoriento.
CUÁNTO USAR	4 cucharadas en un cuarto de agua (o 2 onzas líquidas (60 cc) concentrado con 3 cuartos de galón (2.85 l) de agua).
	Para hacer preguntas o comentarios, llamar al número gratuito 1-877 BayerAG (1-877-229-3724).

INGREDIENTE ACTIVO:

Aceite de canola 96%

OTROS INGREDIENTES 4%

TOTAL 100%

**PARA USAR EN JARDINES
E INVERNADEROS
DEL HOGAR**

INDICACIONES DE USO

Es una violación de la Ley Federal utilizar este producto de manera contraria a la indicada en la etiqueta.

ANTES DE USAR	• Leer toda la etiqueta. Usar sólo como se indica. • Agitar bien antes de de cada uso. • Mojar bien todas las áreas con plagas y de las plantas. • Repetir el tratamiento en 1 ó 2 semanas, si es necesario.
----------------------	---

(continuación)

INDICACIONES DE USO (continuación)

CÓMO USAR	Para fórmulas al 2%: mezclar 4 cucharadas del concentrado con un cuarto de agua (o 2 onzas líquidas (60 cc) de concentrado con tres cuartos de agua). Agitar bien antes de cada uso y batir o agitar el rocío diluido con frecuencia durante el uso. Aplicar un cuarto de la fórmula cada 3 yardas cuadradas (2.5 metros cuadrados). Aplicar a una tasa de 2% de fórmula. Rociar bien las plagas de insectos hasta que las plantas estén mojadas utilizando rociadores con aplicador manual, rociadores manuales o rociadores de mochila. Repetir el tratamiento en 1 ó 2 semanas, si es necesario. Aplicar un cuarto de la fórmula cada 3 yardas cuadradas (2.5 metros cuadrados).
PARA USAR SOBRE	HORTALIZAS: frijoles, col, maíz, calabazas, melones, guisantes, papas, alubias de soja, tomates FRUTAS Y NUECES: manzanas, cerezas, cítricos, higos, uvas, peras, nueces, frambuesas, fresas ÁRBOLES ORNAMENTALES Y QUE PROPORCIONAN SOMBRA: Abedul, árboles de hojas perennes, acebo, roble Plantas de interiores, plantas florecientes, plantas con follaje y de canteros
CONTROL DEL MILDIU POLVORIENTO	Para el control del mildiu polvoriento en frutas, hortalizas, rosas, arbustos, plantas de interiores y ornamentales: aplicar bien en las superficies superior e inferior de la hoja. Continuar la aplicación cada 7 a 14 días, según sea necesario, hasta eliminar la enfermedad.
INDICACIONES PARA USO EN PERÍODO DE LETARGO	Controla las etapas de incubación de los huevos de las plagas presentes en la temporada de letargo y las escamas, ácaros y cocos en arbustos aletargados (tales como rosas), árboles de hojas perennes, plantas leñosas, árboles frutales y árboles que proporcionan sombra. Para el uso en periodo de letargo, aplicar una fórmula al 2%, mezclar 4 cucharadas de concentrado con un cuarto de agua (o 2 onzas líquidas (60 cc) de concentrado con tres cuartos de agua). Mojar bien las plantas o árboles aletargados.
TOMAR MEDIDAS DE PRECAUCIÓN	El aceite elimina el florecimiento glauco (azul) de árboles de hojas perennes como el picea del Colorado y picea pungens Koster. Tener precaución con los pimpollos y los brotes y con las plantas sensibles al aceite tales como: Chamaecyparis, criptomeria, acebo japonés, cedro rojo y árbol de las pelucas. Si le preocupa la sensibilidad de las plantas, probar rociar una parte de la planta y esperar varios días para determinar si se producen quemaduras antes de rociar áreas más grandes.

(continuación)

INDICACIONES DE USO (continuación)

TOMAR MEDIDAS DE PRECAUCIÓN (continuación)

No combinar con azufre y no continuar una aplicación previa de azufre o aplicar azufre después de una aplicación de este material hasta que transcurra tiempo suficiente (por lo menos 30 días).

Al utilizarlos juntos o inmediatamente antes o después de rociar, este producto puede incrementar la fitotoxicidad de compuestos de dinitro o fungicidas como Captan, Folpet, Karathene y Morestan o compuestos de cobre. Si le surgen dudas, tratar una pequeña área con rocío de la combinación y esperar varios días para determinar si se producen quemaduras.

No utilizar este producto cuando las temperaturas son superiores a 90 °F (32 °C).

Cuando las temperaturas descienden a menos de 32 °F (0 °C) durante la noche, no rociar los árboles y cultivos de vides hasta que las temperaturas diurnas se hayan templado a un punto superior a 35 °F (2 °C) y los cultivos no presenten humedad debido a la escarcha derretida o rocío intenso.

El uso de este producto sobre cítricos después del 1° de octubre puede incrementar la susceptibilidad del árbol a los daños producto del frío.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

ALMACENAMIENTO

- Almacenar este producto en el contenedor original y mantener en un área segura de almacenamiento fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

ELIMINACIÓN



Si está vacío: Contenedor no reusable. No volver a utilizar ni rellenar este contenedor. Colocarlo en la basura o entregarlo para reciclar si fuera posible.

Si está parcialmente lleno: Llamar a la agencia local de residuos sólidos o al número 1-877-229-3724 para solicitar indicaciones para la eliminación. Nunca colocar el producto sin utilizar debajo de algún desagüe interno o externo.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

PELIGROS PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN

- Evitar el contacto con la piel o la ropa.
- Lavarse prolijamente con agua y jabón después de manipular este producto y antes de comer, beber, masticar goma de mascar o fumar.

PELIGROS AMBIENTALES

Para proteger el medio ambiente, no permitir que el pesticida ingrese o se escurra en las bocas de tormenta, zanjas, alcantarillas o aguas superficiales. Aplicar este producto cuando el clima esté calmo y no haya probabilidad de lluvia para las 24 horas siguientes, ayudará a garantizar que el viento o la lluvia no dispersen o escurran el pesticida del área de tratamiento. Enjuagar el equipo de aplicación sobre el área tratada ayudará a evitar el escurrimiento a los cursos de agua o los sistemas de desagüe.

PRIMEROS AUXILIOS +

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA

- Quitar la ropa contaminada.
- Enjuagar la piel de inmediato con abundante agua durante 15 a 20 minutos.
- Llamar a un médico o a un centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento.

NOTA: Para solicitar información médica de emergencia, llamar al número gratuito 1-877-229-3763. Tener el contenedor o la etiqueta del producto a mano al llamar a un médico, a un centro de control de envenenamiento o al concurrir a un tratamiento.

GARANTÍA:

En la medida que sea acorde con la ley pertinente, el vendedor garantiza que este producto cumple con la descripción química de la etiqueta y es razonablemente apto para los propósitos que se indican en esta etiqueta sólo cuando es utilizado de acuerdo con las indicaciones en condiciones normales de uso. Hasta el máximo grado permitido por la ley, el vendedor no será responsable de los daños provocados por el uso de este producto por parte del comprador de manera contraria a las indicaciones de la etiqueta, o en condiciones anormales de uso o en condiciones razonablemente imprevisibles para el vendedor. En la medida que sea acorde con la ley pertinente, el vendedor no otorga otra garantía, ya sea expresa o implícita.

Garantía de devolución de dinero: Si usted no está satisfecho con el producto, gustosamente le reembolsaremos el monto original del precio de compra.