

— USE WITH —
CONFIDENCE ON
FLORATAM

LB8658



**KILLS WEEDS
NOT THE LAWN**

KILLS DOLLARWEED • DANDELION • CLOVER • YELLOW NUTSEDGE*

FOR USE ON SOUTHERN GRASSES

Keep Out Of Reach Of Children

CAUTION † See inside booklet for weed list. Read the entire label first. Observe all precautions and follow directions carefully. See back panel booklet for additional precautionary statements and first aid.

Mantener Fuera Del Alcance De Los Niños

PRECAUCION † See inside booklet for weed list. Read the entire label first. Observe all precautions and follow directions carefully. See back panel booklet for additional precautionary statements and first aid.

ACTIVE INGREDIENTS:

Pennisauram 0.14%

Sulfentrazone 0.14%

2,4-D, dimethylamine salt 1.46%

Dicamba, dimethylamine salt 0.41%

OTHER INGREDIENTS: 97.85%

Total 100.00%

THIS PRODUCT CONTAINS:

0.013 lb Pennisauram per gallon or 0.14%.

0.013 lb Sulfentrazone per gallon or 0.14%.

0.109 lb 2,4-dichlorophenoxyacetic acid equivalent per gallon or 1.21%.

0.031 lb 3,6-dichloro-o-anisic acid equivalent per gallon or 0.34%.

*See inside booklet for weed list.

NET CONTENTS / CONTENIDO NETO: 32 fl oz (1 qt) / 946mL



CONCENTRATE

FORMULATED FOR THE SOUTH

KILLS 93 TYPES OF WEEDS



For best results in non-lawn areas like garden beds, patios and driveways, use Roundup® Weed & Grass Killer Concentrate Plus



Questions & Comments
Call 1-866-572-0035 or Visit our Website at www.roundup.com

Preguntas y comentarios
Llámenos al 1-866-572-0035 o Visiten nuestro Sitio Web en www.roundup.com



EPA Reg. No. 2217-1010-538
EPA Est. No. 239-IA-3,
239-MS-001¹⁶
Superscript is first letter
of lot number.

Sold by: The Scotts Company
14111 Scottslawn Rd
Marysville, OH 43041
© 2016 The Scotts Company LLC.
World rights reserved.



LB8657

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

Do not apply this product in a way that will contact any person or pet, either directly or through drift. Keep people and pets out of the area during application. Do not allow people or pets to enter the treated area until sprays have dried. For any requirements specific to your state or tribe, consult the Agency responsible for pesticide regulations.

PRODUCT DESCRIPTION

Roundup® For Lawns, contains multiple active ingredients to provide excellent broadleaf weed control in established warm-season and cool-season turfgrasses. Weeds controlled include dollarweed, dandelions, clover and yellow nutsedge. Weed injury symptoms are normally noticed within a few days of the application and weed death can occur within 14 to 28 days. Weed injury symptoms include leaf and stem curl or twisting and weed yellowing.

USE RESTRICTIONS

- For residential use only.
- Do not apply with nozzles that produce a fine-droplet spray. Do not apply when the wind is blowing toward desirable plants. Do not spray exposed roots of ornamentals and trees.
- Do not broadcast apply to bare ground or paved surfaces.
- Do not use clippings from the treated areas as mulch or compost around flowers, ornamentals, trees, or in vegetable gardens.
- Do not use on or around vegetables, fruits or ornamentals (flowers, trees, groundcovers, hedges, landscape/flower beds and shrubs).
- Measuring utensils such as measuring cups or measuring spoons should not be used for any food or drinking water purposes after use with this product.
- Do not apply to any body of water such as lakes, streams, rivers, ponds, reservoirs, or estuaries (salt water bays). Do not apply to any shorelines (non-cropland sites adjacent to the edges of a body of water) for lakes, streams, rivers, ponds, reservoirs, or estuaries (salt water bays).
- Do not apply this product through any type of irrigation system.

BROADLEAF WEEDS CONTROLLED

This product will control or suppress the following broadleaf weeds. Apply when weeds are young and actively growing.

BROADLEAF WEEDS

Aster, white heath & white prairie	Chickweed, common	Dayflower
Bedstraw	Chickweed, mouseear	Deadnettle
Beggarweed, creeping	Chicory	Dock
Beggarweed, dwarf	Cinquefoil	Dogfennel
Bindweed	Clover	Dollarweed (pennywort)
Black medic	Clover, hop	Doveweed*
Broadleaf plantain	Clover, red	English daisy
Bull thistle	Clover, white (Dutch clover, honeysuckle clover, white trefoil, & purplewort)	False dandelion (spotted catsear & common catsear)
Burdock	Cocklebur	Field bindweed
Burdock, common	Coffeeweed	(morningglory & creeping jenny)
Buttercup, creeping	Compassplant	Field oxeye-daisy (creeping oxeye)
Carpetweed	Curly dock	
Catsear, spotted	Dandelion	
Chamberbitter*		

Filaree, whitestem & redstem	Oxalis (yellow woodsorrel & creeping woodsorrel)	Smartweed
Florida betony (rattlesnake weed)*	Parsley-piert	Spurweed
Florida pusley	Pennsylvania smartweed	Thistle
Goldenrod	Pepperweed	Veronica (corn speedwell)*
Ground ivy	Pigweed	Vetch, common
Groundsel	Pineappleweed	Virginia buttonweed*
Hawkweed	Plantain, buckhorn*	Virginia pepperweed
Healall	Plantain, common*	Wild carrot
Henbit	Poison ivy	Wild garlic
Innocence (Blue-eyed Mary)	Poison oak	Wild geranium
Knotweed	Puncturevine	Wild lettuce
Lambsquarters	Purple cudweed	Wild mustard
Lawn burweed	Purslane	Wild onion
Lespedeza, common	Ragweed	Wild strawberry*
Mallow, common	Redweed	Wild violet*
Matchweed	Red sorrel (sheep sorrel)	Yarrow
Nutsedge (yellow)	Roundleaf mallow	Yellow rocket
Old world diamond flower	Shepherd's purse	
	Spurge	

* **Hard-to-control:** May require two applications and higher use rates within the specified rate range.

WHERE TO USE

Roundup® For Lawns, may be used on established lawns, vacant lots, playgrounds and other similar areas where broadleaf weeds are present. It will control weeds in St. Augustinegrass (including Floratam), Bermudagrass, buffalograss, centipedegrass, seashore paspalum, bahiagrass, zoysiagrass, Kentucky bluegrass, tall fescue, and red or fine leaf fescues.

Turfgrass tolerance to this product may vary. Temporary turfgrass yellowing may occur on St. Augustinegrass and certain varieties of hybrid Bermudagrass. Do not use on bentgrass, carpetgrass, dichondra, and lawns with desirable clovers or other desirable legumes, or on ornamentals (flowers, trees, groundcovers, landscape beds, and shrubs).

STATE RESTRICTIONS:

New York: Not for sale or use in New York State.

HOW MUCH AND WHEN TO APPLY

Mix the specified amount of product with water in a backpack, pump, hose-end, or power sprayer. Spray uniformly as a broadcast or spot treatment.

The best time for broadleaf weed applications is when weeds are young, actively growing, and soil moisture is adequate. Normally a single application is sufficient to control broadleaf weeds in these conditions. Two applications may be necessary for hard-to-control weeds, dense infestations of perennial weeds, for adverse/extreme environmental conditions, or for hardened-off and mature weeds.

The lower application rates within the specified range will normally provide satisfactory weed control. The higher application rates within the specified range are required for hard-to-control weeds, dense infestations of perennial weeds, for adverse/extreme environmental conditions, or for hardened-off and mature weeds.

APPLICATION RATES FOR WEED CONTROL IN TURFGRASSES		
TURFGRASS TYPE	USE RATE PER APPLICATION	REMARKS
St. Augustinegrass (improved varieties including Floratam and Bitterblue), St. Augustinegrass (common varieties), Hybrid Bermudagrass, Bahiagrass, Zoysiagrass, Buffalograss, Seashore paspalum, Centipedegrass, Common Bermudagrass, Kentucky bluegrass, Annual bluegrass, Tall fescue, Red or fine leaf fescues	Mix 5.3 fl.oz. in 2 to 4 gallons of water and spray over 1000 sq.ft. Mix 2 2/3 fl.oz. per gallon of water for every 500 sq.ft.	Do not apply this product to St. Augustinegrass (all varieties) below 50°F. Do not apply to St. Augustinegrass (all varieties) when temperatures are above 85°F unless temporary injury can be tolerated. Do not make applications of this product to St. Augustinegrass when turf is going into dormancy in the fall, or if temperatures are expected to drop below 40°F within 10 days of application. This product may be applied to dormant bermudagrass, dormant zoysiagrass, and dormant bahiagrass. Use caution when applying this product to warm-season turfgrasses when turf is going into dormancy in the fall or coming out of dormancy in the spring as some injury may occur. Do not apply to ryegrass or turfgrass blends containing ryegrass.
Limitations on Treatments: Maximum rate per application is 5.3 fl.oz. per 1000 sq.ft. [0.20 lb 2,4-D ae per acre, 0.023 lb penoxsulam per acre, 0.06 lb dicamba ae per acre, and 0.023 lb sulfentrazone per acre]. Maximum rate per season is 10.6 fl.oz. per 1000 sq.ft. [0.40 lb 2,4-D ae per acre, 0.046 lb penoxsulam per acre, 0.11 lb dicamba ae per acre, and 0.046 lb sulfentrazone per acre]. Do not apply more than 2 broadcast treatments per season. A minimum of 30 days is required between applications.		

HOW TO APPLY

HAND-OPERATED TANK SPRAYERS

For hand-operated sprayers (backpack, knapsack, tank-type or pump-up):

- Determine the total lawn area to be sprayed. For rectangular areas, multiply the length by the width to obtain total square feet.
- Mix 2 2/3 fl.oz. per gallon of water for every 500 sq.ft.
- Spray evenly over the lawn. Spray coverage should be uniform and complete.

DIAL-TYPE HOSE-END SPRAYERS

1. Fill

- Measure the total lawn area to be sprayed. For rectangular areas, multiply the length by the width to obtain total square feet.
- Add the specified amount of product to the spray bottle to treat the total lawn area.
- Do not add water to the sprayer jar.

2. Set The Dial

- Set the dial to 2.5 fl. oz.

3. Spray

- Apply evenly over the lawn.

Important: To prevent sprayer from clogging, always clean after use, as directed.

SPRAY DRIFT MANAGEMENT

It is the responsibility of the applicator to avoid spray drift at the application site. Do not allow the herbicide solution to mist, drip, drift, or splash from treated areas onto desirable broadleaf plants, as small amounts of this product can damage sensitive plants near the treated area. If desirable plants are accidentally sprayed, immediately rinsing leaves with water may reduce or eliminate plant damage.

USE PRECAUTIONS

- Temporary yellowing may occur to some turfgrasses following application. Sensitive species include St. Augustinegrass, Centipedegrass, and hybrid Bermudagrass.
- Applications made when ambient temperatures are above 90°F (85°F for St. Augustinegrass) may cause undesirable turf injury. Do not apply at these temperatures unless temporary turf injury can be tolerated.
- Rainfast in as little as 4 hours. Do not apply this product immediately before rainfall or irrigation. Do not irrigate or water the turfgrass within 3 hours after application. If dry conditions exist, irrigate at least 8 hours before and 8 hours after application.
- Delay mowing 2 days before and until 2 days after the application of this product.
- To avoid turf injury, use only on turfgrass that is reasonably free of stress from diseases, insects, excess heat or cold, drought or excess rainfall/irrigation, shaded areas, low soil pH, nematodes, improper mowing or improper applications of fertilizer and pesticides. Injury can occur if this product is applied under any of these or other stress conditions.
- Do not apply this product to warm-season turfgrasses when turf is going into dormancy in the fall or coming out of dormancy in the spring as some injury may occur.
- Avoid fall or winter applications unless turf stunting can be tolerated.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food, or feed by storage and disposal.

PESTICIDE STORAGE:	Store in original container in a locked storage area. Keep from freezing.
---------------------------	---

PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING:	Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. If empty: Place in trash or offer for recycling if available. If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.
---	--

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION: Causes moderate eye irritation. Harmful if absorbed through skin or if swallowed. When using this product, wear long-sleeved shirt, long pants, socks, shoes and rubber gloves. Wash thoroughly with soap and water after handling. After using this product, rinse gloves before removing, remove clothing and launder separately before reuse, and promptly and thoroughly wash hands and exposed skin with soap and water. Remove saturated clothing as soon as possible and shower.

FIRST AID	
IF IN EYES:	• Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15 - 20 minutes. • Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.
IF SWALLOWED:	• Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. • Have person sip a glass of water if able to swallow. • Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. • Do not give anything by mouth to an unconscious person.
IF ON SKIN OR ON CLOTHING:	• Take off contaminated clothing. • Rinse skin immediately with plenty of water for 15 - 20 minutes. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.
Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. You may also contact 1-866-572-0035 for emergency medical treatment information.	

ENVIRONMENTAL HAZARDS

This product is toxic to fish and aquatic invertebrates. Do not apply directly to water, or to areas where surface water is present, or to intertidal areas below the mean high water mark. Drift or runoff may be hazardous to aquatic organisms in water and to plants adjacent to treated areas. Do not contaminate water when disposing of equipment wash waters or rinsate. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid run off to water bodies or drainage systems.

This chemical has properties and characteristics associated with chemicals detected in groundwater. The use of this chemical in areas where soils are permeable, particularly where the water table is shallow, may result in groundwater contamination. Application around a cistern or well may result in contamination of drinking water or groundwater.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

¹GUARANTEED RESULTS. If for any reason you are not satisfied after using this product, simply send us original proof of purchase and we will refund the purchase price.

INSTRUCCIONES DE USO

Utilizar este producto de modo inconsistente con las declaraciones de su etiqueta constituye una violación de las leyes federales.

No aplique este producto de forma que entre en contacto con otras personas o mascotas, ya sea directamente o al ser arrastrado por el viento. Durante la aplicación, mantenga alejadas del área a las personas y las mascotas. Las personas y las mascotas pueden ingresar al área tratada luego de que se seque el rocío. Para informarse sobre requerimientos específicos de su estado o tribu, consulte con la agencia encargada de reglamentar el uso de pesticidas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Roundup® Para Céspedes, contiene múltiples ingredientes activos que proveen un excelente control sobre las malezas en el césped de temporada caliente y temporada fría. Las malezas controlables incluyen la hidrocolita, diente de león, trébol y juncia. Síntomas de daños por malezas se pueden detectar luego de varios días después de utilizarse y las malezas pueden comenzar a morir entre 14 a 28 días. Los síntomas de daños en las malezas pueden incluir hojas y tallos enroscados y malezas tornándose amarillas.

RESTRICCIONES DE USO

- Solo para uso residencial.
- No utilizar con boquilla que produce una gota pequeña al rociar el producto. No utilizar cuando el viento está soplando hacia plantas que desea mantener. No rociar en raíces expuestas de árboles y plantas decorativas.
- No rociar en el suelo descubierto o superficies pavimentadas.
- No usar partes de las áreas tratadas como mantillo o composta alrededor de flores, plantas decorativas, árboles o huertos.
- No usar en o alrededor de vegetales, frutas o plantas ornamentales (flores, árboles, cubiertas vegetales, setos, jardines/lechos de flores y arbustos).
- Ningún instrumento de medida tales como tazas de medir o cucharas de medir podrán ser utilizados para el consumo de alimentos o agua potable después de usarse con este producto.
- No echar en ningún cuerpo de agua tales como lagos, arroyos, ríos, charcas, reservas, o estuarios (bahías de agua salada). No echar en las orillas (tierras de cultivo adyacentes a las orillas del cuerpo de agua) de lagos, arroyos, ríos, charcas, reservas o estuarios (bahías de agua salada).
- No echar este producto a través de ningún tipo de sistema de irrigación.

DÓNDE USAR

Roundup® Para Céspedes, puede utilizarse en césped, lotes vacíos, parques y otros lugares similares donde se encuentren malezas. Eliminará las malezas de San Agustín (incluyendo floratam), de Bermuda, búfalo, de ciempiés, pasto de orilla, pasto de bahía, pasto zoysia, pasto azul de Kentucky, festuca alta, y festuca roja o de hoja fina.

La tolerancia del césped a este producto podría variar. Césped amarillento podría ocurrir en césped de San Agustín y algunas variedades de césped híbrido de Bermuda. No usar en césped de césped torcido, alfombra, dicandra y en césped con tréboles u otras legumbres, u otras plantas ornamentales (flores, árboles, cubiertas vegetales, jardines y arbustos).

RESTRICCIONES DEL ESTADO:

Nueva York: Prohibida la venta o uso en el estado de Nueva York.

CUÁNTO Y CUÁNDO UTILIZARLO

Mezcle las cantidades específicas del producto con agua en una mochila, tanque, manguera, rociador a presión. Rocíe uniformemente como un tratamiento de área o localizado.

El mejor momento para utilizar este producto es cuando las malezas están jóvenes, creciendo activamente y la humedad de la tierra es adecuada. Normalmente una sola aplicación es suficiente para eliminar las malezas en estas condiciones. En ocasiones será necesario aplicarlo dos veces para malezas difíciles de eliminar, para infecciones densas de plantas perennes, para condiciones del ambiente adversas o extremas o para malezas maduras y fuertes.

El mejor momento para utilizar este producto es cuando las malezas están jóvenes, creciendo activamente y la humedad de la tierra es adecuada. Normalmente una sola aplicación es suficiente para eliminar las malezas en estas condiciones. En ocasiones será necesario aplicarlo dos veces para malezas difíciles de eliminar, para infecciones densas de plantas perennes, para condiciones del ambiente adversas o extremas o para malezas maduras y fuertes.

NIVELES DE USO PARA ELIMINAR LAS MALEZAS EN EL CÉSPED		
TIPO DE CÉSPED	CANTIDAD POR USO	OBSERVACIONES
Césped San Agustín (mejoró variedades que incluyen floratam y bitterblue), césped San Agustín (variedades comunes), césped híbrido Bermuda, césped Bahía, césped zoysia, césped Buffalo, orilla paspalum, césped ciempiés, césped común Bermuda, césped azul Kentucky, césped anual azul, festuca alta, festuca roja o de hoja fina.	Mezclar 5.3 onzas en 2 a 4 galones de agua y rociar sobre 93 m² pies cuadrados. Mezclar 2 2/3 onzas por galón de agua por cada 46 m² pies cuadrados.	No utilizar este producto en césped San Agustín (todas las variedades) por debajo de 10°C. No utilizar este producto en césped San Agustín (todas las variedades) cuando la temperatura está sobre los 29°C a menos que lesiones temporeras sean toleradas. No utilizar este producto en césped St. Agustín cuando el césped estará inactivo durante el otoño o que las temperaturas se esperen bajen de los 4°C después de 10 días de haberlo utilizado. Este producto puede ser utilizado en césped Bermuda inactivo, césped zoysia inactivo y césped bahía inactivo. Tenga precaución cuando utilice este producto en césped de temporada caliente cuando el césped estará inactivo durante el otoño o terminando inactividad en la primavera pues podrían ocurrir lesiones. No utilice en césped de centeno o mezclas de césped que contengan centeno.
Limitaciones en tratamientos: La cantidad máxima a utilizar es de 5.3 onzas por cada 93 m² [90 gramos 2,4-D ae por acre, 10 gramos de herbicida penoxsulam por acre, 27 gramos de herbicida dicamba ae por acre y 10 gramos de herbicida sulfentrazone por acre]. Cantidad máxima por temporada es 10.6 onzas por cada 93 m² [181 gramos 2,4-D ae por acre, 21 gramos de herbicida penoxsulam por acre, 50 gramos de dicamba ae por acre, y 21 gramos de sulfentrazone por acre]. No utilizar en más de 2 tratamientos por temporada. Un mínimo de 30 días es requerido entre cada uso.		

CÓMO APLICAR

TANQUES DE ROCIADORES MANUALES

Para rociadores manuales (mochila, mochila de saco, tanque o inflable):

- Determinar el área que será rociada. Para áreas rectangulares, multiplicar el largo por ancho para determinar el total de metros cuadrados.
- Mezclar 2 2/3 onzas por cada galón de agua por cada 46 m².
- Rociar equitativamente el césped. La rociada debe ser uniforme y completa.

ROCIADORES DE MANGUERA TIPO MARCADOR

1. Llenar

- Medir el total del área del césped a ser rociada. Para áreas rectangulares, multiplicar el largo por ancho para determinar el total de metros cuadrados.
- Añadir la cantidad específica del producto a la botella de rociar para darle tratamiento a todo el césped.
- No añadir agua al envase de rociar.

2. Regular el marcador

- Regule el marcador a 2.5 onzas.

3. Rociar

- Aplique uniformemente sobre el césped.

Importante: Para prevenir que el rociador se obstruya, límpielo según las instrucciones después de utilizarlo.

MANEJO DE ROCÍO ACUMULADO

Es responsabilidad del que utiliza el producto de evitar rocío acumulado en el lugar donde se utilice. No permita que el herbicida se evapore, gotee, acumule o salpique en áreas con plantas que desea mantener, pues pequeñas cantidades de este producto pueden hacerle daño a plantas sensitivas cerca del área donde se está utilizando. Si las plantas que desea mantener son accidentalmente rociadas con este producto, inmediatamente enjuague las hojas con agua para reducir o eliminar cualquier daño a las plantas.

PRECAUCIONES DE USO

- Algunos céspedes se podrían poner amarillos después de utilizarse el producto. Algunas especies sensitivas incluyen San Agustín, Ciempiés y Bermuda híbrido.
- Cuando se utiliza mientras la temperatura del ambiente está sobre los 32°C (29°C para césped San Agustín) podría causar daños en el césped. No lo utilice en estas temperaturas a menos que este tipo de daño pudiese ser tolerado.
- Resistente a la lluvia en 4 horas. No utilizar este producto inmediatamente antes de llover o regar. No riegue el césped dentro de las primeras tres (3) horas posteriores a la aplicación. De imperar condiciones secas, riegue al menos 8 horas antes y 8 horas después de la aplicación.
- Postergue el corte de césped 7 días antes y hasta 2 días después de la aplicación de este producto.
- Para evitar daños en el césped, utilice sólo en césped que sea razonablemente libre de enfermedades, insectos, exceso de calor o frío, sequía o exceso de lluvia/irrigación, áreas con sombra, tierra con pH bajo, nematodos, corte de grama inadecuado o utilización inadecuada de fertilizantes y pesticidas. Daños pueden ocurrir si este producto se utiliza en estas y otras condiciones.
- No utilice este producto en césped de temporada caliente, cuando el césped estará inactivo por el otoño o saliendo de la inactividad durante la primavera pues podrían ocurrir daños.
- Evite utilizarlo durante el otoño o el invierno a menos que el retraso del crecimiento se pueda tolerar.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contamine el agua, la comida ni el pienso para animales al almacenar o eliminar el producto.

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA:	Guarde el producto en su envase original en un área de almacenamiento cerrada. Proteja del congelamiento.
ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA Y MANEJO DEL ENVASE:	Este envase no se puede rellenar. No vuelva a usar o a rellenar este envase. Si está vacío: Téilo a la basura o recíclalo, de ser posible. Si está parcialmente lleno: Llame a su agencia local de desechos sólidos para obtener instrucciones sobre cómo eliminarlo. Nunca elimine el producto no utilizado en drenajes internos o externos.

AVISOS DE PRECAUCIÓN

RIESGOS PARA LOS SERES HUMANOS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN: Puede causar irritación en los ojos. Nocivo si es absorbido por la piel o tragado. Cuando utilice este producto, use camisa con mangas largas, pantalones largos, medias, zapatos y guantes de goma. Lávese con agua y jabón luego de utilizar este producto. Después de usar este producto, enjuague los guantes antes de quitárselos, quítese la ropa y lávela por separado antes de volverla a usar, inmediatamente y cuidadosamente lávese las manos y la piel expuesta con agua y jabón. Remueva toda pieza de ropa que esté saturada con el producto lo antes posible y dúchese.

PRIMEROS AUXILIOS	
SI ENTRA EN LOS OJOS:	• Mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos lentamente y con cuidado con agua por 15 a 20 minutos. • Retire los lentes de contacto, de haberlos, después de transcurridos los primeros 5 minutos, y continúe enjuagando el ojo. • Llame a un centro de control de envenenamientos para recibir instrucciones de tratamiento.
SI ES TRAGADO:	• Inmediatamente llame al centro de control de envenenamiento para recomendaciones de tratamiento. • Que la persona beba un vaso de agua si puede tragar. • No induzca el vómito, a menos que así se lo indique el centro de control de envenenamiento o un médico. • No darle nada por boca a una persona inconsciente.
EN LA PIEL O LA ROPA:	• Quítese la ropa contaminada. • Inmediatamente enjuague la piel con mucha agua por 15-20 minutos. • Llame al centro de control de envenenamiento para recomendaciones de tratamiento.
Tenga el envase o la etiqueta del producto con usted cuando llame al centro de envenenamientos o al médico, o al acudir a recibir tratamiento. También puede llamar al 1-866-572-0035 para obtener información sobre tratamiento médico de emergencia.	

RIESGOS MEDIOAMBIENTALES

Este producto es tóxico para los peces y los invertebrados acuáticos. No lo aplique directamente al agua, en áreas donde haya agua presente en la superficie ni en zonas intermareales por debajo de la línea de la marea alta. El producto que se escurra o sea arrastrado por el viento puede ser peligroso para las plantas y para los organismos acuáticos de los cuerpos de agua adyacentes a las superficies tratadas. No contamine el agua al deshacerse de la que use para lavar o enjuagar los utensilios. Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida penetre o se escurra en drenajes pluviales, zanjas de desagüe, cunetas o aguas superficiales. La aplicación de este producto en un día tranquilo, cuando no se pronostiquen lluvias para las próximas 24 horas, ayudará a asegurar que ni el viento ni la lluvia arrastren o laven el pesticida fuera del área de tratamiento. Enjuagar el equipo usado para la aplicación sobre el área tratada ayudará a evitar escurrimientos hacia cuerpos de agua o sistemas de drenaje.

ADVERTENCIA: En la medida contemplada por las leyes correspondientes, el comprador asume toda la responsabilidad por la seguridad y el uso de este producto si no se siguen las instrucciones.

***RESULTADOS GARANTIZADOS.** Si por algún motivo usted no queda satisfecho después de usar este producto, simplemente envíenos el comprobante de compra original y le reembolsaremos el precio de compra.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION: Causes moderate eye irritation. Harmful if absorbed through skin or if swallowed. When using this product, wear long-sleeved shirt, long pants, socks, shoes and rubber gloves. Wash thoroughly with soap and water after handling. After using this product, rinse gloves before removing, remove clothing and launder separately before reuse, and promptly and thoroughly wash hands and exposed skin with soap and water. Remove saturated clothing as soon as possible and shower.

FIRST AID	
IF IN EYES:	• Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15 - 20 minutes. • Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.
IF SWALLOWED:	• Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. • Have person sip a glass of water if able to swallow. • Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. • Do not give anything by mouth to an unconscious person.
IF ON SKIN OR ON CLOTHING:	• Take off contaminated clothing. • Rinse skin immediately with plenty of water for 15 - 20 minutes. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.
Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. You may also contact 1-866-572-0035 for emergency medical treatment information.	

ENVIRONMENTAL HAZARDS

This product is toxic to fish and aquatic invertebrates. Do not apply directly to water, or to areas where surface water is present, or to intertidal areas below the mean high water mark. Drift or runoff may be hazardous to aquatic organisms in water and to plants adjacent to treated areas. Do not contaminate water when disposing of equipment wash waters or rinsate. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid run off to water bodies or drainage systems.

This chemical has properties and characteristics associated with chemicals detected in groundwater. The use of this chemical in areas where soils are permeable, particularly where the water table is shallow, may result in groundwater contamination. Application around a cistern or well may result in contamination of drinking water or groundwater.



Questions & Comments

Call 1-866-572-0035 or Visit our Website at www.roundup.com

Preguntas y comentarios

EPA Reg. No. 2217-1010-538
EPA Est. No. 239-4A-3; 239-MS-001¹⁸
Superscript is first letter of lot number.
Sold by: The Scotts Company
14111 Scottslawn Rd
Marysville, OH 43041
© 2016 The Scotts Company LLC.
World rights reserved.

LB8657