

helps to maintain and promote a healthy
bronchial system. Vent d'aide contribue à maintenir et
promouvoir un système bronchique équine en bonne santé.

Directions for Use: For optimum results administer dose syringe
(not included, 60mL) orally once a day 2-3 days prior to exercise
or race. For additional support, administer dose syringe (60mL)
orally two hours prior to exercise or race.

Mode d'emploi: Pour des résultats optimaux administrer
seringue de dose (non inclus, 60 ml) par voie orale une fois par
jour 2-3 jours avant d'exercer ou de la race. Pour une aide
supplémentaire, administrer seringue de dose (60 ml) par voie
orale deux heures avant l'exercice ou de la race.

Cautions: Do not combine with prescription medication. Do not exceed
recommended dose.

Précautions: Ne pas combiner avec des médicaments d'ordonnance.
Ne pas dépasser la dose recommandée.

Contraindications: Internal use: Not for pregnant or lactating animals.
Not for use in animals with gastrointestinal conditions. Not for use in
animals with kidney disease. Not for use in animals with liver disease.
Not for use in young animals.

Contre-indications: Usage interne: Pas pour femelles gestantes ou
allaitantes. Ne pas utiliser chez les animaux avec troubles gastro-
intestinaux. Ne pas utiliser chez les animaux atteints de maladie
rénale. Ne pas utiliser chez les animaux présentant une maladie du
foie. Ne pas utiliser chez les jeunes animaux.

Store at room temperature (15-30°C / 59-86°F)
Conserver à la température ambiante (15-30°C / 59-86°F)



Scan this code with your
mobile for a video on how
to apply this product.

